



# 11.11.7. HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 6-7 URTEKO BIZTALEENTZAT

| Txertoa                     | Aurretiazko dosien kopurua                  | Jarduera                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetanosa duen txertoa       | 0                                           | Txertoaren 4 dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. eta 3. eta 4 dosien artean). |
|                             | 1                                           | Txertoaren 3 dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. eta 3. eta 4 dosien artean). |
|                             | 2                                           | Txertoaren 2 dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabeteko tartea 2. eta 3. eta 3. eta 4. dosien artean)                                        |
|                             | 3                                           | Txertoaren dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td 1 ematea, behar denaren arabera (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tartea)                                                                 |
|                             | 4                                           | Txertoaren dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td 1 ematea, behar denaren arabera (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tartea) 4. dosia < 4 urtekoa bada. 4. dosia > 4 urte ez badu behar.     |
| Polioa autoktonoetan        | 0                                           | VPI duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).                                                                 |
|                             | 1                                           | VPI duen 2 txerto-dosi ematea arabera (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).                                                         |
|                             | 2                                           | VPI duen txerto-dosi 1 ematea (gutxienez 6 hilabeteko tartea 2. eta 3. dosien artean)                                                                                                         |
|                             | 3 (3. dosia ≤ 4 urte)                       | VPI duen txerto-dosi 1 ematea , behar (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tartea)                                                                                                            |
|                             | 3 (3. dosia > 4 urte )                      | ez dago jarduketarik                                                                                                                                                                          |
| Polioa atzerritarretan      | 0                                           | VPI duen 3 txerto-dosi ematea , gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete 2. eta 3. dosien artean                                                                     |
|                             | ≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)            | ez dago jarduketarik                                                                                                                                                                          |
|                             | ≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)                  | Gutxienez 4 hilabeteko tartean VPI duen 2 txerto-dosi osatzea                                                                                                                                 |
| Men C/ACWY                  | 0                                           | Men ACWY dosi 1                                                                                                                                                                               |
|                             | 1 edo 2 (azkena < 12 hilabeteko adinarekin) | Men ACWY dosi 1                                                                                                                                                                               |
|                             | 1 edo 2 (azkena ≥12 hilabeteko adinarekin)  | ez dago jarduketarik                                                                                                                                                                          |
| B hepatitis duen txertoa ** | 0                                           | VHB duen 3 txerto-dosi ematea ematea , (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).                                                        |
|                             | 1                                           | VHB duen 2 txerto-dosi ematea ematea (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).                                                          |
|                             | 2                                           | VHB duen txerto-dosi 1 ematea ematea (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).                                                          |
|                             | 3                                           | ez dago jarduketarik                                                                                                                                                                          |
| VNC                         | 0                                           | dosi 1 ematea                                                                                                                                                                                 |
|                             | ≥ 1 (azkena < 11 hilabeteko adinarekin)     | Dosi 1 ematea (azken dositik gutxienez 2 hilabetera)                                                                                                                                          |
|                             | ≥ 1 (azkena ≥11 hilabeteko adinarekin)      | ez dago jarduketarik                                                                                                                                                                          |
| Hirukoitz birikoa           | 0                                           | Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tartea)                                                                                                                                              |
|                             | 1                                           | 2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean                                                                                                                |
|                             | 2                                           | Ez dago jarduketarik                                                                                                                                                                          |
| Barizela                    | 0                                           | Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tartea)                                                                                                                                              |
|                             | 1                                           | 2. dosia egutegiaren arabera, gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean                                                                                                               |
|                             | 2                                           | Ez dago jarduketarik                                                                                                                                                                          |

\*6 hilabete entre 2. y 3. dosien artean hexabalentea erabiltzen bada.

\*\* 1go eta 3. dosien arteko gutxieneko tartea 16 astekoa izango da VHB monovalentea erabiltzen bada.

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib 7 urtera arte  
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI 13 urtera arte Monovalenteak VPI, VHB  
VPI Intramuskularra den polio tribalentearen aurkako txertoa