



11.11.8. HAUREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 8-9 URTEKO BIZTALEENTZAT

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa	0	Txertoaren 4 dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. eta 3. eta 4 dosien artean).
	1	Txertoaren 3 dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. eta 3. eta 4 dosien artean).
	2	Txertoaren 2 dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabeteko tartea 2. eta 3. eta 3. eta 4. dosien artean)
	3	Txertoaren dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td 1 ematea, behar denaren arabera (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tartea)
	4	Txertoaren dosi hexabalente/tetrabalente/dTpa/Td 1 ematea, behar denaren arabera (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tartea) 4. dosia < 4 urtekoa bada. 4. dosia > 4 urte ez du behar.
Polioa autoktonoak	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	VPI duen 2 txerto-dosi ematea arabera (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	VPI duen txerto-dosi 1 ematea (gutxienez 6 hilabeteko tartea 2. eta 3. dosien artean)
	3 (3. dosia ≤ 4 urte)	VPI duen txerto-dosi 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tartea)
	3 (3. dosia > 4 urte)	ez dago jarduketarik
Polioa Atzerritarrian jaioak	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea , gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete 2. eta 3. dosien artean
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	ez dago jarduketarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	Gutxienez 4 hilabeteko tartean VPI duen 2 txerto-dosi osatzea
Men C/ACWY	0	Men ACWY dosi 1
	1 edo 2 (azkena < 12 hilabeteko adinarekin)	Men ACWY dosi 1
	1 edo 2 (azkena ≥12 hilabeteko adinarekin)	ez dago jarduketarik
B hepatitis duen txertoa **	0	VHB duen 3 txerto-dosi ematea ematea , (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	VHB duen 2 txerto-dosi ematea ematea (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	VHB duen txerto-dosi 1 ematea ematea (gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	3	ez dago jarduketarik
VNC	0	dosi 1 ematea
	≥ 1 (azkena < 11 hilabeteko adinarekin)	Dosi 1 ematea (azken dositik gutxienez 2 hilabetera)
	≥ 1 (azkena ≥11 hilabeteko adinarekin)	ez dago jarduketarik
Hirukoitz birikoa	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tartea)
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean
	2	Ez dago jarduketarik
Barizela	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tartea)
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tartea 1. eta 2. dosien artean
	2	Ez dago jarduketarik

** 1go eta 3. dosien arteko gutxieneko tartea 16 astekoa izango da.

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib 7 urtera arte
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI 13 urtera arte Monobalenteak VPI, VHB
VPI Intramuskularra den polio tribalentearen aurkako txertoa