



11.11.9. HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 10-14 URTEKO BIZTALEENTZAT

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa¹	0	Txertoaren 4 dosi tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. eta 3. eta 4. dosien artean).
	1	Txertoaren 3 dosi tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. eta 3. eta 4. dosien artean).
	2	Txertoaren 2 dosi tetrabalente/dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. eta 3. eta 4. dosien artean)
	3	Txertoaren dosi tetrabalente/dTpa/Td 1 ematea, behar denaren arabera (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	4	Txertoaren dosi tetrabalente/dTpa/Td 1 ematea, behar denaren arabera (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte) 4. dosia < 4 urtekoa bada.; 4. dosia > 4 urte ez du behar.
Polioa 2016 baino lehen txertatutako autoktonoak edo atzerrian jaotakoak	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	VPI duen 2 txerto-dosi ematea arabera (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	VPI duen txerto-dosi 1 ematea (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. dosien artean)
	3 (3+1 pauta)	VPI duen txerto-dosi 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa 2016tik aurrera txertatutako atzeritarrak	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea , gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete 2. eta 3. dosien artean
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	ez dago jarduketarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	Gutxienez 4 hilabeteko tartean VPI duen 2 txerto-dosi osatzea
ACWY²	0	Men ACWY dosi 1
	≥ 1 (azkena < 10 urterekin)	Men ACWY dosi 1
B hepatitis duen txertoa^{**}	0	VHB duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	VHB duen 2 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	VHB duen txerto-dosi 1 ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	3	ez dago jarduketarik
VNC 2015tik aurrera jaiotakoak	0	dosi 1 ematea
	≥ 1 (azkena < 11 hilabeteko adinarekin)	Dosi 1 ematea
	≥ 1 (azkena ≥11 hilabeteko adinarekin)	ez dago jarduketarik
Hirukoitz birikoa	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	Dosi 1 eman (1. eta 2. dosien artean gutxienez 4 astetako tarte)
	2	Ez dago jarduketarik
Barizela	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	Dosi 1 eman (1. eta 2. dosien artean gutxienez 4 astetako tarte)
	2	Ez dago jarduketarik
PAPILOMA³	0	dosi 1
	≥ 1	ez dago jarduketarik

**** 1go eta 3. dosien arteko gutxienezko tarte 16 astekoa izango da.**

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

1 13 urtera arteko txerto tetrabalentea. 14 urtetik aurrera, erabili Td/sartu dTpa dosi bat; Td erabili behar izanez gero (> 13 a) **2** 12 urteko dosien baliokidea da

3 Harrapatzeko unean 12 urte baino gehiago baditu

Txertoak: hexabalentea DTPa-VPI-VHB-Hib 7 urtera arte
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Tetrabalentea DTPa-VPI 13 urtera arte Monobalenteak VPI, VHB
VPI Intramuskularra den polio tribalentearen aurkako txertoa