



11.12.1 TXERTAKETA-HISTORIARIK EZ DUTEN HELDUEN EGUTEGIA EGOKITZEA

2026	HARTATZETIK EMAN BEHARREKO DOSIA			
	1978 AREN AURRETIK	1978 1980	1981 1994	1995 ETIK AURRERA
Td	5 dosi	5 dosi	5 dosi	5 dosi
VPI ¹ atzeritarretan ¹	3 dosi	3 dosi	3 dosi	3 dosi
Men ACWY				dosi 1 2001etik aurrera jaiotakoak
B Hepatitis			3 dosi	3 dosi
Hirukoitz Birikoa		2 dosi	2 dosi	2 dosi
Barizela *	2 dosi ²	2 dosi ²	2 dosi ²	2 dosi
Papiloma				1 dosi ³ ≤ 25 urte 2 dosi ³ ≥ 26 urte
Herpes Zoster *	2 dosi 1960, 1961 eta 1951an jaiotakoak			
VNC ⁴	1 dosi 65 urtetik aurrera			
Gripe	1 dosi 60 urtetik aurrera, urtero			
COVID-19	1 dosi 70 urtetik aurrera urte-sasoiko			

* Ezin dira batera administratu. **1** Poliobirusen zirkulazioa duten herrialdeetatik datozenetan bakarrik <https://polioeradication.org/about-polio/polio-this-week/>
2 mmunitate-ebidentziarik ez duten pertsonak (ikus 3.2 kapitulua) **3** 1995etik jaiotako emakumeak eta 2007tik jaiotako gizonak **4** Pneumokokoaren aurkako txertorik jaso ez duten pertsonengan

	PAUTA	GUTXIENKO TARTEAK		
		1. eta 2. dosien artean	2. eta 3. dosien artean	Oroitzapen-dosien artean
Td	0-1-12h-10 u-10u	hilabete 1	6 hilabete	12 hilabete *
VPI	0-1-7 h	hilabete 1	6 hilabete	6 hilabete
Hirukoitz Birikoa	0-1 h	hilabete 1		
B Hepatitis	0-1-6 h	hilabete 1	2 hilabete **	
Papiloma	Dosi 1 ≤ 25 urte 2 dosi ≥ 26 urte	6 hilabete		
	3 dosi AT/immunosupresio egoeretan	hilabete 1	3 hilabete	
Barizela	0-1 h	hilabete 1	Ezin dira batera administratu. Barizelarekiko immunitate- ebidentziarik gabe, eman barizela lehenik, eta zóster txertoa 8 asteko tartearekin emateko jarraibidea osatu ondoren	
Herpes Zoster	0-2 h	hilabete 1		

*4. dositik 5.era 10 urte. ** Gutxienez 16 asteko 1. eta 3. dosien arteko gutxieneko tartearekin