



11.12.2. TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 15-18 URTEKO BIZTANLEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa¹	0	Txertoaren 5 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (lehen txertaketa, gutxienez 4 asteko tarte, 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete 2. eta 3. dosien artean, eta oroitzapeneko bi dosi, 10 urteko tarteekin).
	1	Txertoaren 4 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (lehen txertaketa, gutxienez 4 asteko tarte, 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete 2. eta 3. dosien artean, eta oroitzapeneko bi dosi, 10 urteko tarteekin).
	2	Txertoaren 3 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. eta oroitzapeneko bi dosi, 10 urteko tarteekin)
	3	Txertoaren 2 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 12 hilabeteko tarte 3. eta 4. dosien artean eta 10 urte 4. eta 5. dosien artean)
	4	Txertoaren dosi 1 dTpa/Td ematea, 10 urteko tarte 4. eta 5. dosien artean
	5	ez dago jarduketarik
Polioa 2016 baino lehen txertatutako autoktonoak edo atzerritarrak	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabete 2. eta 3. dosien artean).
	1	VPI duen 2 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 6 hilabete 2. eta 3. dosien artean).
	2	VPI duen txerto-dosi 1 ematea (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. dosien artean)
	3 (3+1 pauta)	VPI duen txerto-dosi 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa 2016tik aurrera txertatutako atzerritarrak	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea , gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean eta 6. hilabete 2. eta 3. dosien artean
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	ez dago jarduketarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	Gutxienez 4 hilabeteko tartean VPI duen 2 txerto- dosi osatzea
Men ACWY	0	Men ACWY dosi 1
	≥ 1 (azkena < 10 urterekin)	Men ACWY dosi 1
	≥ 1 (azkena ≥ 10 urterekin)	ez dago jarduketarik
B hepatitis duen txertoa**	0	VHB duen 3 txerto-dosi ematea ematea , (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	1	VHB duen 2 txerto-dosi ematea ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	2	VHB duen txerto-dosi 1 ematea ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. dosien artean, eta 2 hilabetekoa 2. eta 3. dosien artean).
	3	ez dago jarduketarik
Hirukoitz birikoa	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	Dosi 1 administratu (1. eta 2. dosien artean gutxienez 4 astetako tarte)
	2	Ez dago jarduketarik
Barizela	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	Dosi 1 administratu (1. eta 2. dosien artean gutxienez 4 astetako tarte)
	2	Ez dago jarduketarik
PAPILOMA	0	dosi 1
	≥ 1	ez dago jarduketarik

**** 1go eta 3. dosien arteko gutxieneko tarte 16 astekoa izango da.**

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

1 16 urteko dosiak barne

Txertoak: Tetrabalentea DTPa-VPI 13 **urtera arte**
VPOb Ahoko polio bibalentearen aurkako txertoa

Monobalenteak VPI, VHB
VPI Intramuskularra den polio tribalentearen aurkako txertoa