

BERRIZTAPEN TERAPEUTIKOEN FITXA

FICHA DE INNOVACIONES TERAPEUTICAS



OSO INTERESGARRIA
MUY INTERESANTE



INTERESGARRIA
INTERESANTE



ERABILGARRIA NOIZEAN
BEHIN
EVENTUALMENTE UTIL



EZ DAKAR EZER BERRIRIK
NO APORTA NADA NUEVO



ESPERIENTZIA KLINIKO
GUTXIEGIA
EXPERIENCIA CLINICA
INSUFICIENTE



PLAVIX
Klopidogrela
Sanofi

ISCOVER
Klopidogrela
Bristol Myers

75 mg-ko 28
komprimidoak
Prezioa: 11.507 pta.



TALDE
TERAPEUTIKOA/INDIKAZIOAK

Plaketeen agregazioaren
inhibitzaileak.
Ebentu aterosklerotikoen
prebentzio sekundarioa.



**PLAVIX
ISCOVER**

KOMENTARIOAK

Klopidogrela, tiklopidinarekin kimikoki erlazionatuta dagoen plaketeen antiagregante berri bat da, eta indikatuta dago miokardio infartua duela gutxi jasan duten pazienteentzat, baita burmuin infartua edo arteriopatia periferikoa jasan dutenentzat ere, gaixoei ebentu aterosklerotikoen prebentzio sekundarioa egiteko, hots, miokardioko infartua, garuneko infartua eta kausa baskularrarengatiko heriotzen prebentzio sekundarioa egiteko. Klopidogrelak adenosina difosfatoaren (ADPn) eta bere plaketa-erzeptorearen arteko batasuna selektiboki inhibitzen du, plaketa-agregazioa inhibituz. Entseiu kliniko garrantzitsuena aspirinarekin konparatuz egin da, ebentu aterosklerotikoen prebentzio sekundarioa egiteko (miokardioko infartua, garuneko infartua eta kausa baskularrarengatiko heriotzen prebentzio sekundarioa egiteko), eta entseiu horretan klopidogrelak erakutsi duenez, aspirinak baino pittin bat efikazagoa da; izan ere, ebentu aterosklerotikoen urteko arriskua %5,83koa izan da klopidogrelarekin, eta aspirinarekin, berriz, %5,32koa. Klopidogrelarako eta aspirinarako deskribatu diren efektu kaltegarriak antzerakoak dira eta ondoko hauek dira: sabel-esteko trastornoak (dispepsia/nauseak/gonbitoak) (%15), trastorno hemorragikoak (%9,3), azaleko erupzioak (%6), beherakoak (%4,5). Tiklopidinarekin konparatuz, klopidogrelak abantaila bat du: neutropenia gutxiago sortzen duela (%0,1a klopidogrelarekin eta %2,4a tiklopidinarekin) baita neutropenia larri txikiagoa ere bai (%0,05a klopidogrelarekin eta %0,8a tiklopidinarekin). Ebentu aterosklerotikoak jasateko arriskua apur bat txikiagoa da klopidogrelarekin, aspirinarekin baino; baina alde txiki horrek ez du justifikatzen paziente guztiek klopidogrela har dezaten bere prezioa oso altua delako. Osagarrizko ebentu aterosklerotiko bat prebenitzeko, 196 paziente tratatu beharko lirateke klopidogrelarekin, ez aspirinarekin. Momentuz, ebentu aterosklerotikoen prebentzio sekundarioari dagokionez, lehen elektioko antiagregantea aspirina da. Klopidogrela, tiklopidina baino medikamendu seguruago denez, aspirina kontraindikatu duten pazienteentzako elektioko tratamendua izango litzateke.



TRATAMENDUAREN KOSTUA
EGUNEKO

Klopidogrela 75 mg= 411 Pta.
Aspirina 300 mg= 16 Pta.
Tiklopidina 500 mg= 242 Pta.

PLAVIX
Clopidogrel
Sanofi

ISCOVER
Clopidogrel
Bristol Myers

75 mg 28 comprimidos
Precio: 11.507 ptas.

GRUPO TERAPÉUTICO / INDICACIONES

Inhibidores de la agregación
plaquetaria
Prevención secundaria de
eventos ateroscleróticos

COMENTARIOS

El clopidogrel es un nuevo antiagregante plaquetario químicamente relacionado con ticlopidina, que ha sido aprobado para la prevención secundaria de eventos ateroscleróticos (infarto de miocardio, infarto cerebral y muerte de causa vascular) en pacientes con infarto de miocardio reciente, infarto cerebral reciente o arteriopatía periférica establecida.

Clopidogrel inhibe de forma selectiva la unión de adenosina difosfato (ADP) a su receptor plaquetario, inhibiendo así la agregación plaquetaria. En el ensayo clínico principal realizado frente a aspirina en prevención secundaria de eventos ateroscleróticos (infarto de miocardio, infarto cerebral o muerte por causa vascular), clopidogrel ha mostrado una reducción del riesgo anual de sufrir dichos eventos (5,32%) algo superior a la aspirina (5,83%). Los efectos adversos descritos para el clopidogrel han sido similares a los de la aspirina y son: trastornos gastrointestinales (dispepsia/náuseas/vómitos) (15%), trastornos hemorrágicos (9,3%), erupciones cutáneas (6%), diarrea(4,5%).

El clopidogrel presenta la ventaja sobre la ticlopidina de producir una menor incidencia de neutropenia (0,1 y 2,4% respectivamente) y de neutropenia grave (0,05 y 0,8% respectivamente).

La pequeña reducción del riesgo de sufrir eventos ateroscleróticos con respecto a la aspirina no justifica el tratamiento con clopidogrel en todos los pacientes debido a su elevado precio. Habría que tratar 196 pacientes con clopidogrel en lugar de con aspirina para prevenir un evento aterosclerótico adicional.

Por el momento, la aspirina continúa siendo el antiagregante de elección en la prevención secundaria de eventos ateroscleróticos. Debido a que clopidogrel es un fármaco más seguro que ticlopidina, sería el fármaco de elección en los pacientes en los que la aspirina esté contraindicada.

COSTE TRATAMIENTO/DÍA

Clopidogrel 75 mg= 411 Ptas.
Aspirina 300 mg= 16 Ptas.
Ticlopidina 500 mg= 242 Ptas.

Sendagai hauei buruz zehetasun gehiago jakiteko edo zerbait argitzeko honekin harremanetan jarri: e-mail: cevime-san@ej-gv.es
MEBEIZ - Tel. 945 18 92 66
Para ampliar o aclarar cualquier aspecto relacionado con estos u otros medicamentos póngase en contacto con: e-mail: cevime-san@ej-gv.es
CEVIME - Tel. 945 18 92 66



Osakidetza
Servicio vasco de salud

Emandako informazioa orain duguna da eta etorkizunean gerta daitezkeen aurrerapen zientifikoen arabera aldatzen da. La información que aquí se presenta es la disponible hasta el momento y es susceptible de modificaciones futuras en función de los avances científicos que se produzcan.