

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:

CYMBALTA®, **XERISTAR®** (duloxetina)

<http://www.osanet.euskadi.net>
(profesionales)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

En depresión...

... es necesario un tratamiento global

Cymbalta 60mg
Duloxetina



» Duloxetina 60mg al día demostró EFICACIA desde la 1ª SEMANA en síntomas emocionales, ansiosos y físicos de la depresión.⁽¹⁾

» Duloxetina fue SUPERIOR a Fluoxetina y Paroxetina en el cambio medio de la PUNTUACIÓN TOTAL de la HAMD-17.^(2,3)

» La TOLERABILIDAD de Duloxetina fue comparable a la de los ISRS estudiados.⁽³⁾

» La DOSIS INICIAL y de recomendada de Cymbalta es de una vez al día.⁽⁴⁾

» De nuevo e

Datos de abstracts y comunicaciones a congresos.

En la evaluación de la EMEA hay ensayos no publicados en los que duloxetina ni siquiera mostró diferencias estadísticamente significativas respecto a placebo.

folleto promocional original: CYAP06015

El ensayo frente a placebo no estaba diseñado para demostrar diferencias en la velocidad del inicio del efecto.

Normalmente la respuesta terapéutica se observa a las 2-4 semanas de tratamiento (ficha técnica).

Comparación indirecta: no son datos de un ensayo clínico en el que se comparan ambas alternativas.

Xeristar® 60mg
duloxetina HCl

Xeristar®, nuevo antidepresivo eficaz en el tratamiento de la depresión y de los síntomas físicos asociados⁽¹⁾

• Mayor eficacia que los ISRS: 44% de remisión a la 8.ª semana⁽⁴⁾ (35% de remisión ISRS).⁽⁵⁾

• Rapidez de acción: eficacia demostrada desde la primera semana.⁽²⁾

• Alivio sintomático del dolor a la primera semana de tratamiento.⁽⁴⁾

• Fácil manejo: dosis única terapéutica de 60 mg una vez al día.⁽²⁾

• Perfil de seguridad comparable a los ISRS.⁽⁴⁾



Antidepresivo eficaz que además actúa sobre los síntomas físicos⁽¹⁾

folleto promocional original: Sp/XERI050-Feb 06

BIBLIOGRAFÍA DEL FOLLETO ORIGINAL

CYMBALTA®

1. Hirschfeld RM, et al. *Depress Anxiety*. 2005;21(4):170-7.
2. Thase ME, et al. Presented at the 156th Annual Meeting of the APA; San Francisco, CA; May 17-22, 2003.
3. Swindle RW et al. *Int J Neuropsychopharmacol*. 2004;7(S1):S351

XERISTAR®

2. Hirschfeld RM, et al. *Depress Anxiety*. 2005;21(4):170-7.
4. Detke MJ, et al. *J Clin Psychiatry*. 2002;63(4):308-15.
5. Thase M, et al. *Br J Psychiatry*. 2001;178:234-41.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 115/2006 y su informe