



# CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:



<http://www.osanet.euskadi.net>  
(profesionales)

## AVIDART® (dutasterida)

Sólo se destacan aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

### El 2º inhibidor de la 5α-reductasa... Uno más.



La HBP es una enfermedad progresiva (18)

Los 5 ARIs son una opción terapéutica adecuada para pacientes con síntomas moderados/severos y un aumento del tamaño prostático (>30-40 ml) (11)

Se desconoce la utilidad clínica de esta diferencia<sup>5</sup>.

**Avidart®, a diferencia de finasterida:**

- Proporciona una supresión de la DHT sérica del 90-95% (1) (Finasterida: 70-75%) (1)
- Una proporción significativamente mayor de hombres tratados con Avidart® mejoraron a los 3 meses la puntuación del cuestionario AUA-SI (13)

**Avidart® reduce el volumen prostático desde el 1º mes (9)**

La mejora sintomática no es apreciable hasta pasados 3 a 6 meses<sup>2</sup>.

Avidart® aporta mejoras significativas en el bienestar psicológico en pacientes con HBP (12)



AVI067(03/05)

### Bibliografía del folleto original

### folleto promocional original: AVI067(03/05)

- Madersbacher S, et al. EAU 2004 Guidelines on Assessment, therapy and follow-up of men with lower Urinary Tract Symptoms Sugesstive of Benign Prostatic Obstruction (BPH Guidelines). Eur Urol. 2004; 46:547-54.
- Roehrborn CG et al. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology. 2002;60(3):434-41.
- Clark RV, et al. Marked Suppression of Dihydrotestosterone in Men with Benign Prostatic Hyperplasia by Dutasteride, a Dual 5α-Reductase Inhibitor. J Clin Endocrinol Metab 2004. 89: (5) 2179-84.
- Gitelman M, et al. Sustained prostate volume reduction with dutasteride ayer 4 years is independent of baseline prostate volume. J Urol. 2004; 171 (Suppl. 4):358:1360.
- Roehrborn C, et al. Measurement of the effect of dutasteride on worry and embarrassment associated with lower urinary tract symptoms in men BPH: use of novel instrument. Eur Urol. (Suppl.4) 2005. No. 3, 212 (abs 838).
- Hagerty J, et al. Aprospective, comparative study of the onset of symptomatic benefit of dutasteride versus finasteride in men with benign prostatic hyperplasia in everyday clinical practice. J Urol. 2004; 171 (Suppl. 4):356:1353.
- Debruyne F, et al. Efficacy and Safety of Long-Term Treatment with the Dual 5α-reductase Inhibitor Dutasteride in Men with Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia. Eur Urol. 2004;46(4):488-95.
- Barkin J, et al. Alpha-blocker therapy can be withdrawn in the majority of men following initial combination therapy with the dual 5α-reductase inhibitor dutasteride. Eur Urol. 2003;44(4):461-66.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº102/2005 y su informe