

# BERRIZTAPEN TERAPEUTIKOEN FITXA

<http://www.euskadi.net/sanidad>

53. Zkia. - 2000

## EMADINE

Emedastina

**EMADINE**  
Alcón Cusí S.A.

0,05% 5ml-ko kolirio  
Prezioa: 2.004 pta.



▼ EZ DAKAR EZER BERRIRIK

### TRATAMENDUAREN KOSTUA HILEKO

Emedastina 0,05% 5 ml = 2.004 pta.

Azelastina 0,05% 6 ml= 1.518 pta.

Klorfenamina 2,5 mg 5 ml= 211 pta.

Lebokabastina 0,05% 4 ml= 1.234 pta.

### INDIKAZIOAK

Konjuntibitis alergikoaren sintomak tratatzeko

### KOMENTARIOAK

Emedastina sendagai antihistaminiko anti-H1 berria da eta urtaroko konjuntibitis alergikoen sintomak tratatzeko balio du. Entsegu klinikoetan erakutsi duenez, emedastina plazeboa baino eraginkorragoa dela konjuntibitis alergikoarekin asoziatutako azkuraren prebentzioan.

Emedastinaren posologia gomendatua honako hau da: tanta bat gaixorik dagoen begian, egunean bi aldiz. Sarrien azaltzen den efektu kaltegarria zefalea da (%11a); bestalde, %5a baino gutxiagoko inzidentzia duten efektu kaltegarriak hauexek dira: ikusmen "lauso", begien lehortasuna, astenia, zapore txarra, azkura... Absortzio sistemikoa ea gertatzen ez denez, ez dago interakziorik beste medikamentuekin. Lentillak erabiltzen dituztenek, kolirioa eman eta gero, 10-15 minutu itxaron behar dute lentillak jarri arte, bestela, kolirioak benzalkonio kloruroa (eszipiente) duenez, lentilla bigunak honda ditzake.

Ez da argitaratu entsegu klinikorik indikazio berarako erabiltzen diren beste anti-H1 antihistaminikoekin (lebokabastina, azelastina, klorfenaminarekin) konparatzeko; beraz, ezin dugu jakin zer toki dagokion emedastinari konjuntibitis alergikoen terapeutan. Momentuz eta konparazio-entsegu klinikorik ez dagoenez, lehengo antihistaminikoak erabiltzea gomendatzen dugu, azkeneko hauen eraginkortasuna eta seguritatea frogatuta baitago eta gainera merkeagoak baitira.



▼ OSO INTERESGARRIA



▼ INTERESGARRIA



▼ ERABILGARRIA NOIZEAN BEHIN



▼ EZ DAKAR EZER BERRIRIK



▼ ESPERIENZA KLINIKO GUTXIEGIA

# FICHA DE INNOVACIONES TERAPEUTICAS

<http://www.euskadi.net/sanidad>

N.º 53 - 2000

## EMADINE

Emedastina

**EMADINE**  
Alcón Cusí S.A.

Colirio 0,05% 5ml  
Precio: 2.004 ptas.



▼ NO APORTA NADA NUEVO

### COSTE TRATAMIENTO/MES

Emedastina 0,05% 5 ml = 2.004 ptas.

Azelastina 0,05% 6 ml= 1.518 ptas.

Clorfenamina 2,5 mg 5 ml= 211 ptas.

Levocabastina 0,05% 4 ml= 1.234 ptas

### INDICACIONES

Tratamiento de los signos y síntomas de la conjuntivitis alérgica estacional.

### COMENTARIOS

La emedastina es un nuevo antihistamínico anti-H1 comercializado para el tratamiento de los signos y síntomas de la conjuntivitis alérgica estacional. En ensayos clínicos frente a placebo emedastina ha mostrado ser más eficaz que éste en la prevención del picor asociado a la conjuntivitis alérgica.

La posología recomendada es de una gota en el ojo afectado, 2 veces al día. El efecto adverso más comúnmente observado tras la aplicación de emedastina es la cefalea(11%); con una incidencia inferior al 5% se producen visión borrosa, sequedad ocular, astenia, mal sabor, picor...

Debido a que su absorción sistémica es mínima, no se han observado interacciones con otros medicamentos. Las personas usuarias de lentes de contacto deben esperar 10-15 minutos tras la administración del colirio antes de ponerse las lentes de contacto, ya que el cloruro de benzalconio(excipiente) que contiene esta especialidad farmacéutica, puede deteriorar las lentes de contacto blandas.

No se han publicado ensayos clínicos comparativos frente a otros antihistamínicos anti-H1 (levocabastina, azelastina, clorfenamina) utilizados en la misma indicación; por lo que no podemos establecer cual es su lugar en la terapia de la conjuntivitis alérgica. Por el momento, y ante la ausencia de ensayos clínicos comparativos, recomendamos la utilización de los antihistamínicos más antiguos cuya eficacia y seguridad está demostrada, y además, son más baratos.



▼ MUY INTERESANTE



▼ INTERESANTE



▼ EVENTUALMENTE ÚTIL



▼ NO APORTA NADA NUEVO



▼ EXPERIENCIA CLÍNICA INSUFICIENTE