

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

▼ RELVAR® (Fluticasona/vilanterol en EPOC)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL : : ESP/FFT/0053/14 (SEPTIEMBRE 2014).


▼ RELVAR® ELLIPTA®
(Furoato de fluticasona y Vilanterol. Polvo seco para inhalación)

Relvar® tiene un
impacto positivo sobre las
exacerbaciones en la EPOC...⁸

Se desconoce su
efecto sobre las
exacerbaciones
respecto al
tratamiento
habitual en EPOC.

- Relvar® redujo significativamente en un 27% (0.81 con Relvar 92/22 mcg administrado una vez al día vs 1.11 Vilanterol 22 mcg administrado una vez al día) las exacerbaciones moderadas y graves comparado con Vilanterol 22 mcg administrado una vez al día en pacientes con EPOC con historia de exacerbaciones ($p < 0.0001$)⁸

Reducción alcanzada en la tasa de exacerbaciones moderadas/graves^{8*}



Adaptado de Dransfield MT, Bourbeau J, Jones PW, et al. Lancet Respir Med. 2013.

El comparador
activo seleccionado
en los estudios de
exacerbaciones
(vilanterol) no es un
beta adrenérgico
de larga duración
autorizado en el
tratamiento de la EPOC,
por lo que estos datos
deben interpretarse con
precaución.

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO

8. Dransfield MT, Bourbeau J, Jones PW, Hanania NA, Mahler DA, Vestbo J, et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials. Lancet Respir Med. 2013;1(3):210-23.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME n° 228/2015](#) y en su informe.