

# Anexo I:

## Imágenes de los tipos de MGF

### MGF TIPO I

Se objetivará la ausencia del prepucio clitorídeo con/sin extirpación parcial o total del clítoris.



*En la imagen se observa una extirpación total del clítoris y en su lugar se aprecia una cicatriz queloidea.*

### MGF TIPO II

Implica la resección parcial o total del clítoris y los labios menores y puede incluir el corte de los labios mayores.



*En la imagen se observa una extirpación total del clítoris y los labios menores.*

### MGF TIPO III O INFIBULACIÓN

Se observará un pequeño orificio por el que se produce la salida de la orina y la menstruación. No se identificará el meato uretral ya que está oculto por el sellado de la abertura vaginal tras el corte y recolocación de los labios menores, con o sin resección del clítoris.



*En la imagen se observa un orificio por el que se accede a la vagina, no visualizándose el meato uretral, ya que se encuentra oculto por el corte y recolocación de los labios menores en la línea media.*

## TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LA DESINFIBULACIÓN

Tras el lavado de los genitales con un antiséptico, se introduce el dedo índice a través del introito bajo la cicatriz, con la finalidad de valorar la extensión de la zona a desinfibular. Se realizará una incisión desde el introito en dirección al pubis, siguiendo la línea media sobre la cicatriz y hasta que la uretra sea visible, no más arriba para evitar hemorragias. Posteriormente, se sutura ambos lados por separado.

Para una descripción detallada de la técnica y acceso a imágenes de calidad se puede visitar esta web: <http://www.uptodate.com/es/home> Female genital cutting (circuncisión) .