

3. TABLAS PARA LA VALORACIÓN DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES

ABREVIATURAS

X: Plástico topacio

OX: Cristal topacio

TABLA I: PRECIO DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

| Envase | Nombre | Observaciones | Aportación reducida | Precio/G € |
|--------|------------------------------|--|---------------------|------------|
| | ACÉTICO ÁCIDO MEDICINAL | Solo como monofármaco por vía ótica | | 0,0301 |
| | ACETILCISTEINA | Solo por vía oftálmica | | 0,2627 |
| | ACETILSALICILICO ÁCIDO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,0604 |
| X | ALOPURINOL | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 0,3364 |
| | AMIODARONA CLORHIDRATO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 4,5382 |
| X | AMLODIPINO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 32,0375 |
| X | ATENOLOL | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 2,0671 |
| X | ATROPINA | Solo prescripciones electrónicas de atropina 0,01% colirio 10ml/5ml | | 15,9317 |
| | AZATIOPRINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | |
| | AZUFRE | Solo como prescripciones electrónicas de vaselina azufrada al 6% | | 0,0321 |
| X | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | SÍ | 40,1886 |
| X | BENCILO BENZOATO | Solo por vía tópica en concentraciones del 10 al 30% | | 0,4192 |
| X | BETAMETASONA DIPROPIONATO | Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | | 16,3314 |
| X | BETAMETASONA VALERATO | Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | | 20,9155 |
| | BÓRICO ÁCIDO | Solo como monofármaco por vías ótica y vaginal | | 0,0186 |
| X | CALCIO CARBONATO PRECIPITADO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,0104 |
| | CAPTOPRIL | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 8,6010 |
| | CARBAMAZEPINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 1,3617 |
| X | CARVEDILOL | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 20,6029 |
| X | CICLOSPORINA | Solo por vía oftálmica | | 40,6525 |
| | CITRATO SÓDICO=Sodio citrato | Como principio activo solo en solución de citratos en dosificaciones pediátricas | | 0,0361 |
| | CITRICO ÁCIDO | Como principio activo solo en solución de citratos en dosificaciones pediátricas | | 0,0450 |
| X | CLOBETASOL PROPIONATO | Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | | 20,4406 |



| Envase | Nombre | Observaciones | Aportación reducida | Precio/G € |
|--------|--|---|---------------------|------------|
| | CROMOGLICATO DISÓDICO | Como monofármaco por vía inhalatoria sin visado. Por vía tópica como 40 mg/g emulsión O/A 100 G, sin visado. | SÍ | 2,6106 |
| | DESOXIMETASONA | Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | | 79,3087 |
| X | DEXAMETASONA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas y por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | | 10,3423 |
| | DILTIAZEM | Solo por vía tópica rectal | SÍ | 7,0708 |
| X | DIÓXIDO DE TITANIO= (Tioveil AQN) | Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección | | 0,0961 |
| X | ENALAPRILLO MALEATO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 5,9785 |
| OX | ESPIRONOLACTONA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 3,5525 |
| X | ESTRADIOL VALERATO | Solo como prescripciones electrónicas 1mg cápsulas y 2 mg cápsulas | SÍ | 120,2999 |
| X | ETAMBUTOL CLORHIDRATO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 0,8677 |
| | ETINILESTRADIOL | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 59,0726 |
| | FAMOTIDINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | |
| X | FENOBARBITAL | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 2,5948 |
| | FLECAINIDA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 5,4772 |
| X | 5 FLUOROURACILO | Solo por vía tópica | SÍ | 11,3878 |
| X | FOSFATO DISÓDICO | Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas | | 0,0471 |
| X | FOSFATO MONOPOTÁSICO | Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas | | 0,1051 |
| | FOSFATO MONOSÓDICO DIHIDRATADO=Sodio fosfato monobásico dihidratado | Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas | | 0,0351 |
| | FOSFÓRICO ACIDO | Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas | | 0,0241 |
| X | FUROSEMIDA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 1,4122 |
| X | GRISEOFULVINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 2,8903 |
| OX | HIDROCLOROTIAZIDA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 0,7184 |
| X | HIDROCORTISONA BASE | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas y por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | | 5,6263 |
| X | INDOMETACINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,5762 |
| OX | ODO METALOIDE | Solo por vía sistémica | | 0,2561 |
| X | ISONIAZIDA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 0,6716 |
| X | KELINA | Solo por vía tópica en concentraciones del 2% al 5% | | 3,1324 |
| X | KETOCONAZOL | Solo por vía tópica como monofármaco en forma de gel no detergente | | 3,0519 |
| X | LABETALOL | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | |
| X | LOSARTAN | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | |
| X | METFORMINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 0,1058 |

| Envase | Nombre | Observaciones | Aportación reducida | Precio/G € |
|--------|---|---|---------------------|------------|
| X | METILPREDNISOLONA | Solo por vía oftálmica | | 16,9712 |
| X | METRONIDAZOL | Solo por vía tópica en forma de gel al 2% | | 0,6378 |
| X | NEO HELIOPAN E1000 | Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección | | 0,0996 |
| X | NICOTINAMIDA =Vitamina PP | Solo como monofármaco | | 0,4189 |
| | NIFEDIPINO | Solo por vía tópica rectal | SÍ | 3,8982 |
| X | NISTATINA | Solo por vía vaginal | | 1,0832 |
| | OMEPRAZOL | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 4,6329 |
| | OXIBENZONA | Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección | | 0,1280 |
| | PARSOL 1789 | Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección | | 0,1678 |
| X | PILOCARPINA CLORHIDRATO | Solo por vía oftálmica | | 20,1702 |
| | PIRAZINAMIDA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 1,2158 |
| X | PIRIDOXINA CLORHIDRATO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,4417 |
| | PIRIMETAMINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | |
| | POTASIO BICARBONATO | | | 0,0352 |
| | POTASIO CITRATO | Como principio activo solo en solución de citratos en dosificaciones pediátricas | | 0,0673 |
| | POTASIO CLORURO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,0524 |
| X | POTASIO IODURO | Solo por vía sistémica | | 0,1771 |
| X | PREDNISONA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas y por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | | 12,9411 |
| X | PROPRANOLOL | Solo por vía tópica para población pediátrica | SÍ | 0,5831 |
| X | RETINOICO ÁCIDO TRANS=Trans Retinoico Ácido=Tretinoína=Vitamina A ácida | Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a corticoides | | 14,2768 |
| X | RETINOL=Vitamina A hidrosoluble | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,4200 |
| | RIBOFLAVINA (B2) | Para el tratamiento de enfermedades mitocondriales previo Visado de Inspección | | 0,4147 |
| | RIFAMPICINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,9754 |
| | SALICÍLICO ÁCIDO | En concentraciones inferiores al 10%, solo por vía tópica como monofármaco o asociado a corticoides | | 0,0311 |
| | SODIO BICARBONATO | Solo por vía oral como monofármaco | | 0,0104 |
| | SODIO CITRATO=Citrato sódico | Como principio activo solo en solución de citratos en dosificaciones pediátricas | | 0,0345 |
| | SODIO CROMOGLICATO=Cromoglicato disódico | Como monofármaco por vía inhalatoria sin visado. Por vía tópica como 40 mg/g emulsión O/A 100 G, sin visado. | SÍ | 2,6106 |
| | SODIO FOSFATO MONOBÁSICO DIHIDRATO= Fosfato monosódico dihidratado | Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas | | 0,0351 |

| Envase | Nombre | Observaciones | Aportación reducida | Precio/G € |
|--------|-------------------------|--|---------------------|------------|
| | SODIO FOSFATO TRIBÁSICO | Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas | | 0,0198 |
| X | SULFADIAZINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,2458 |
| | SULFASALAZINA | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 1,0527 |
| | SULISOBENZONA | Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección | | |
| | TACROLIMUS | Solo prescripciones electrónicas de Tacrolimus 2mg 24 supositorios | SÍ | 263 |
| | | Solo prescripciones electrónicas de Tacrolimus 0.03 % colirio 10 ml | | |
| | TIAMINA (B1) | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 0,3374 |
| | TIMOLOL | Solo por vía tópica para población pediátrica | SÍ | 43,1370 |
| | TOPIRAMATO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 5,4455 |
| | TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO | Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos | | 9,7949 |
| | URSODESOXICÓLICO ÁCIDO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | | 2,7999 |
| | VANCOMICINA CLORHIDRATO | Solo prescripciones electrónicas de vancomicina clorhidrato 125mg 40 cápsulas | | 5,1770 |
| | VERAPAMILO | Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas | SÍ | 7,7218 |

Todos los preparados estomatológicos están excluidos según RD 1348/2003, excepto los antifúngicos locales y gastrointestinales

TABLA II: PRECIO DE LOS EXCIPIENTES

| Excipientes | Precio |
|---|--------------------------|
| SOLUCIONES Y SUSPENSIONES ESTÉRILES (inyectables y colirios) | 0,38 €/10 ml o fracción |
| SOLUCIONES Y SUSPENSIONES NO ESTÉRILES (tópicas y rectales): | |
| Acuosas | 0,70 €/100 ml o fracción |
| Hidroalcohólicas y otras no acuosas | 2,34 €/100 ml o fracción |
| Laca de uñas | 4,12 €/10 ml o fracción |
| SOLUCIONES Y SUSPENSIONES NO ESTÉRILES (orales): | |
| Soluciones acuosas | 0,70 €/100 ml o fracción |
| Jarabe simple y suspensiones | 2,18 €/100 ml o fracción |
| Jarabe especial (exclusivamente en prescripciones electrónicas así descritas) | 13,28 €/100ml o fracción |
| PASTAS Y POMADAS ANHIDRAS (incluye oftálmicos) | 1,56 €/100 ml o fracción |
| EMULSIONES Y GELES | 2,18 €/100 ml o fracción |
| POLVOS Y GRANULADOS | 0,78 €/100 g |
| SUPOSITORIOS Y ÓVULOS | 0,04 €/unidad |
| CÁPSULAS GASTRORRESISTENTES | 0,04 €/unidad |

TABLA III: HONORARIOS PROFESIONALES

| FORMA FARMACÉUTICA | Máximo | |
|--|----------------------------|--------|
| Inyectables (soluciones y suspensiones) | 25 | P x 11 |
| Colirios | 1 | P x 11 |
| Pomadas oftálmicas | 1 | P x 12 |
| Óvulos y supositorios | 24 | P x 9 |
| Cápsulas | 100 | P x 9 |
| FORMA FARMACÉUTICA | Gramos ó Mililitros | |
| | Máximo | |
| Pastas y pomadas anhidras | 200 | P x 5 |
| Granulados, emulsiones y geles | 200 | P x 5 |
| Polvos | 200 | P x 3 |
| Soluciones y suspensiones no estériles (incluye jarabes) | 250 | P x 4 |
| Soluciones y suspensiones estériles | 250 | P x 7 |
| Lacas de uñas | 10 | P x 4 |
| Enemas * | 1.000 | P x 5 |

* El volumen total máximo será de 1.000 ml. pudiendo ir distribuidos en varios envases (ej. enemas de 100 ml. podrán ir en una receta hasta 10 enemas, que se tasarán sobre 1.000 ml).

TABLA IV: PRECIO DE LOS ENVASES

| FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS | | |
|--|-----------------------|------------|
| | Volumen/Unidades | Precio (€) |
| Frasco plástico tapón precinto | 30 cc | 0,55 |
| Frasco plástico tapón precinto | 60 cc | 0,63 |
| Frasco plástico tapón precinto | 125 cc | 0,69 |
| Frasco plástico tapón precinto | 250 cc | 0,72 |
| Frasco plástico topacio tapón precinto | 30 cc | 0,52 |
| Frasco plástico topacio tapón precinto | 60 cc | 0,69 |
| Frasco plástico topacio tapón precinto | 125 cc | 0,92 |
| Frasco plástico topacio tapón precinto | 250 cc | 1,09 |
| Frasco cristal topacio tapón precinto | 30 cc | 0,53 |
| Frasco cristal topacio tapón precinto | 60 cc | 0,61 |
| Frasco cristal topacio tapón precinto | 125 cc | 0,70 |
| Frasco cristal topacio tapón precinto | 250 cc | 0,90 |
| Frasco cristal topacio cuentagotas | 30 cc | 1,06 |
| Frasco cristal topacio cuentagotas | 125 cc | 1,23 |
| FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS | | |
| Tubo de plástico | 30 cc | 0,83 |
| Tubo de plástico | 50 cc | 0,96 |
| Tubo de plástico | 75 cc | 1,03 |
| Tubo de plástico | 100 cc | 1,17 |
| Tubo de plástico | 200 cc | 1,41 |
| Frasco cristal topacio con espátula o pincel | 30 cc | 0,88 |
| CÁPSULAS | | |
| Tarro plástico tapa precinto (50 cápsulas nº 0) | 75 cc | 0,73 |
| Tarro plástico tapa precinto (100 cápsulas nº 0) | 175 cc | 0,85 |
| SUPOSITORIOS Y ÓVULOS | | |
| Molde/envase supositorios | 6 unidades o fracción | 2,65 |
| Molde/envase óvulos | 6 unidades o fracción | 4,27 |
| INYECTABLES | | |
| Ampolla 2 ml | 2 cc | |
| Viales 5 ml | 5 cc | 0,61 |
| Viales 10 ml | 10 cc | 0,63 |
| COLIRIOS | | |
| Frasco estéril blanco | 5 cc | 0,90 |
| Frasco estéril blanco | 10 cc | 0,92 |
| POLVOS COMPUESTOS | | |
| Talquera | 100 cc | 0,82 |
| Talquera | 200 cc | 0,94 |
| ENEMAS | | |
| Cánula para enema | 1 cánula | 1,50 |