



OSASUN SAILA

Administrazio eta Finantzaketa
Sanitarioko Sailburuordetza
Farmaziako Zuzendaritza
Farmazia Prestazio Zerbitzua

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Administración y Financiación
Sanitarias
Dirección de Farmacia
Servicio de Prestaciones Farmacéuticas

PRESKRIPZIO EDOTA DISPENTSAZIO BALDINTZA MUGATUAK DITUZTEN MEDIKAMENTUAK

MEDICAMENTOS SUJETOS A CONDICIONES RESTRINGIDAS DE PRESCRIPCIÓN Y/O DISPENSACIÓN

ONARTUTAKO INDIKAZIOAK EDOTA BALDINTZA BEREZIAK **INDICACIONES APROBADAS Y/O REQUISITOS ESPECÍFICOS**

Eguneratua: 2026/09/01
Actualizado: 01/09/2026

MEDICAMENTOS SUJETOS A CONDICIONES RESTRINGIDAS DE PRESCRIPCIÓN Y/O DISPENSACIÓN

El Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, establece que, para asegurar el uso racional de los medicamentos, el Ministerio de Sanidad, podrá someter a reservas singulares las condiciones específicas de prescripción y dispensación de los mismos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

De esta forma, el Ministerial de Sanidad podrá proceder a la imposición de visado en los siguientes casos:

a) Medicamentos sujetos a la calificación de PRESCRIPCIÓN MÉDICA RESTRINGIDA, entendiéndose por tales:

- los medicamentos que, a causa de sus características farmacológicas o por su novedad, o por motivos de salud pública, estén indicados para **tratamientos** que sólo puedan seguirse **en medio hospitalario**;
- los medicamentos que se utilicen en el tratamiento de enfermedades que deban ser **diagnosticadas en medio hospitalario, o en establecimientos que dispongan de medios de diagnóstico adecuados**, aunque la administración y seguimiento pueda realizarse fuera del hospital;

b) Medicamentos que, en virtud de decisión motivada y debidamente publicada de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, queden sujetos a reservas singulares, por cuestiones de seguridad o de limitación para determinados grupos de población de riesgo.

c) Medicamentos para los que se financien únicamente **algunas de sus indicaciones terapéuticas** o que se aplique una **aportación reducida en función del tipo de paciente**, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1348/2003, de 31 de octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC.

Mediante visado, las Administraciones sanitarias verificarán la conformidad del tratamiento prescrito en el Sistema Nacional de Salud con las condiciones de utilización autorizadas en la ficha técnica y las indicaciones terapéuticas financiadas.

Las autoridades sanitarias sólo podrán denegar este visado en los casos en los que no se cumplan las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.

Con objeto de informar adecuadamente a todas y todos los profesionales sanitarios implicados, a continuación se relacionan los medicamentos, susceptibles de ser prescritos en receta médica oficial, sujetos a reservas singulares de las condiciones de prescripción y que requieren de visado previo de la Inspección para su financiación por el Sistema Sanitario Público y su dispensación en las oficinas de farmacia.

Desde marzo de 2020 se relacionan en un **apartado específico** los **principios activos y productos sanitarios que pueden ser indicados por el personal de enfermería y requieren visado**.

ACRÓNIMOS

CPD **Cupón Precinto Diferenciado**

CPD-E **Cupón Precinto Diferenciado-E (Mayores de 75 años)**

DH **Diagnóstico Hospitalario**

FR **Financiación Restringida Determinadas Indicaciones**

SÍMBOLOS

***** **Presentación con aportación reducida**
(10% P.V.P. I.V.A., hasta un máximo de 4,98 €)

PRINTZIPIO AKTIBOEN AURKIBIDEA/ÍNDICE DE PRINCIPIOS ACTIVOS

A

ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA	93
ACIDO ACETOHIROXAMICO	43
ACIDO BEMPEDOICO (CPD)	27
ACIDO BEMPEDOICO/EZETIMIBA (CPD).....	30,31
ACITRETINA (DH)	32,33
ALFACALCIDOL (DH)	8
ALITRETINOINA (DH).....	33
ALPROSTADILO (DH)	42,43
ALPROSTADILO (CPD).....	43
AMISULPRIDA (CPD-E)	75
ANAGRELIDA (DH)	59
APIXABAN (CPD).....	18-21
APOMORFINA (DH)	70,71
ARIPIPAZOL (CPD-E)	76,77
ASENAPINA MALEATO (CPD-E).....	74,75
ATORVASTATINA	25
ATORVASTATINA+AMLODIPINO	31
ATORVASTATINA+EZETIMIBA	29
ATORVASTATINA+ACIDO ACETILSALICILICO+RAMIPRILO.....	31,32

B

BENZBROMARONA (DH)	63
BUSERELINA (CPD)	59,60
BOLSAS RECOGIDA ORINA PIERNA	93
BREXIPRAZOL (CPD-E).....	80
BUDESONIDA (DH).....	3,4

C

CALCITONINA.....	52
CALCITRIOL (DH)	8
CAMARAS DE INHALACION PEDIATRICAS (FR).....	92
CANAGLIFLOZINA (CPD).....	8
CANAGLIFLOZINA+METFORMINA (CPD)	4
CARIPRAZINA (CPD-E)	79,80
CARNITINA (CPD)	9
CEFEPIMA (DH)	55,56
CEFOTAXIMA (DH).....	53
CEFOXITINA (DH).....	52,53
CEFTAZIDIMA (DH).....	54,55
CETRORELIX (DH).....	48
CICLOFOSFAMIDA (DH).....	58

CICLOSILICATO DE SODIO Y ZIRCONIO (CPD)	91
CILOSTAZOL (DH)	12
CLINDAMICINA (DH).....	55,56
CLOBAZAM (CPD).....	80
CLOPIDOGREL (CPD)	10
CLOPIDOGREL + ACIDO ACETILSALICILICO (CPD).....	13,14
CODEINA (FR).....	88
COLECTOR BOLSA RECOG ORINA FEMENINO	94
COLESEVELAM HIDROCLORURO (CPD).....	26,27
COLINA HIDROCLORURO (DH)	91,92
CORIFOLITROPINA-ALFA (DH)	40,41
CORIOGONADOTROPINA ALFA (DH)	40

D

DABIGATRAN ETEXILATO (CPD).....	14-16
DEFERASIROX (DH).....	90
DEXANFETAMINA (DH).....	80
DEXTROMETORFANO (FR)	87
DIHIDROCODEINA (HIDROCODONA) (FR)	64
DIMETILFUMARATO (DH).....	62,63
DONEPEZILO (DH).....	82
DONEPEZILO + MEMANTINA (DH).....	84
DRONEDARONA (DH)	22
DULAGLUTIDA (CPD).....	6,7
DUTASTERIDA (CPD).....	44

E

EDOXABAN (CPD).....	21,22
EMPAGLIFOZINA+LINAGLIPTINA (CPD)	5
ESTROGENOS CONJUGADOS + BAZEDOXIFENO (CPD).....	34
ETONOGESTREL (DH)	34
ETOPOSIDO (DH)	58
EXENATIDA (CPD)	5
EXTRACTO POLEN PHLEUM PRATENSE (CPD)	88,89
EXTRACTO ALERGENICO DE POLVO DE ACAROS DERMATOPHAGOIDES	
PTERONYSSINUS/FARINAE (CPD)	89
EXTRACTO POLEN DACTYLIS GLOMERATA, ANTHOXANTHUM ODORATUM, LOLIUM PERENNE,	
POSA PRATENSIS, PHLEUM PRATENSE (CPD)	89
EZETIMIBA	27

F

**PRINTZIPIO AKTIBOEN AURKIBIDEA/ÍNDICE DE PRINCIPIOS ACTIVOS**

FENTANILO (CPD).....	64-68
FEZOLINETANT (CPD).....	34
FINASTERIDA (CPD).....	43
FINERENONA (CPD).....	23,24
FOLITROPINA DELTA (DH)	40
FOSFOMICINA SODICA (DH).....	57
FLUVASTATINA.....	25

G

GALANTAMINA (DH).....	84
GANCICLOVIR (DH).....	87,88
GANIRELIX (DH).....	47,48
GLUCAGON (CPD)	51,52
GONADOTROPINA CORIONICA (DH)	34
GOSERELINA (CPD).....	60,61
GRANISETRON	1
GUANFACINA (DH)	23

H

HEXAMINOLEVULINICO (DH).....	92
HORMONA FOLICULOESTIMULANTE ALFA (DH).....	37,38
HORMONA FOLICULOESTIMULANTE BETA (DH)	39
HORMONA FOLICULOESTIMULANTE/HORMONA LUTEINIZANTE (DH)	34,35

I

ICOSAPENTO DE ETILO (CPD)	28
INSULINA DEGLUDEC (CPD)	4
INTERFERON GAMMA-1b HUMANO RECOMBINANTE (DH).....	62
ISOTRETINOINA (DH)	33
ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM) (FR)	1

L

LACTITOL (FR)	2
LACTULOSA (FR).....	2
LAGRIMAS ARTIFICIALES (FR)	88
LANREOTIDA ACETATO (DH)	46,47
LASMIDITAN	68
LEVODOPA (CPD).....	69,70

LIDOCAINA (CPD).....	64
LINACLOTIDA (CPD)	3
LINCOMICINA (DH)	56
LINZAGOLIX (DH).....	48-50
LIRAGLUTIDA (CPD)	5,6
LISDEXANFETAMINA (DH)	81
LIXISENATIDA (CPD)	6
LOVASTATINA.....	24
LURASIDONA (CPD-E)	72
LUTROPINA ALFA (DH)	39
LUTROPINA ALFA+FOLITROPINA ALFA (DH).....	41

M

MEMANTINA (DH)	85,86
MEGLUMINA ANTIMONIATO (DH)	86,87
METILNALTREXONA BROMURO (FR)	2
METILPREDNISOLONA (DH)	51
MITOTANO (DH)	59

N

NALDEMEDINA (FR).....	3
NAFARELINA (CPD).....	44
NAFTIDROFURIL (FR)	24
NALMEFENO (CPD)	86
NALOXEGOL (FR)	2
NOSCAPINA (FR).....	87

O

OCTREOTIDA (DH)	45,46
OLANZAPINA (CPD-E)	72,74
OMEGA 3 – TRIGLICERIDOS (FR)	27
ONDANSETRON (DH).....	1

PRINTZIPIO AKTIBOEN AURKIBIDEA/ÍNDICE DE PRINCIPIOS ACTIVOS

P		SIMVASTATINA+EZETIMIBA.....	28
PALIPERIDONA (CPD-E)	77-79	SULODEXIDA (CPD)	9,10
PANCREATINA (DH)	4	T	
PARICALCITOL (DH).....	52	TEST DE UREA (CPD).....	92
PASIREOTIDA (DH).....	47	TICAGRELOR (CPD)	12,13
PATIROMERO CALCICO (CPD)	91	TICLOPIDINA (DH)	11
PEGVISOMANT (DH).....	44	TOLCAPONA (DH).....	72
PITAVASTATINA	26	TRETINOINA (DH).....	59
PITAVASTATINA+EZETIMIBA.....	31	TRIPTORELINA (CPD)	60,61
PRASUGREL (CPD)	12	TRIPTORELINA (DH).....	61,62
PRAVASTATINA	24	U	
PRAVASTATINA+FENOFIBRATO	29	UROFOLITROPINA (DH)	35,36
Q		ULIPRISTAL (CPD).....	41,42
QUETIAPINA (CPD-E)	73,74	V	
R		VANCOMICINA (DH)	56,57
RELUGOLIX, ESTRADIOL Y NORESTISTERONA (CPD).....	50,51	VERICIGUAT (CPD)	23
RIMEGEPANT (CPD)	68,69	Z	
RISPERIDONA (CPD-E)	75-77	ZIPRASIDONA (CPD-E).....	71,72
RIVAROXABAN (CPD)	16-18	PRINCIPIOS ACTIVOS Y PRODUCTOS SANITARIOS QUE PUEDEN SER INDICADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y QUE REQUIEREN VISADO	
RIVASTIGMINA (DH)	82-84	ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA	93,94
ROMOSUZUMAB (DH)	63	FORMULAS MAGISTRALES QUE REQUIEREN VISADO	
ROSUVASTATINA (CPD)	25	EMULSION FOTOPROTECTORA 100 G 1 ENVASE (TIOVEIL 15%, PARSOL 1789 3%, NEO-HELIOPAN E1000 5%)	95
ROSUVASTATINA.....	26	RIBOFLAVINA.....	95
ROSUVASTATINA + ACIDO ACETILSALICILICO	31		
ROSUVASTATINA + AMLODIPINO	32		
ROSUVASTATINA + EZETIMIBA (CPD).....	29,30		
ROSUVASTATINA + EZETIMIBA	30		
ROSUVASTATINA + FENOFIBRATO.....	30		
RUFINAMIDA (DH).....	69		
S			
SEMAGLUTIDA (CPD)	7		
SOMATORELINA (DH).....	91		
SIMVASTATINA.....	24		

PRINTZIPIO AKTIBOEN AURKIBIDEA/ÍNDICE DE PRINCIPIOS ACTIVOS

Eguneratua: 2026/09/01
Actualizado: 01/09/2026

AUTOVACUNAS INCLUIDAS EN RECETA ELECTRÓNICA

NEOVACCINE.....	96
UROMUNE	97
URITAI.....	97
UROVACCINE.....	97,98

VACUNAS INDIVIDUALIZADAS ANTIALÉRGICAS Y AUTOVACUNAS BACTERIANAS <u>EN FORMATO PAPEL</u>.....	99
--	-----------

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
A04AA01	ONDANSETRON DH	*ONDANSETRON 4 MG COMPRIMIDOS *ONDANSETRON 8 MG COMPRIMIDOS *SETOFILM 4 MG PELICULAS BUCODISPERSABLES, 10 SOBRES *SETOFILM 8 MG PELICULAS BUCODISPERSABLES, 10 SOBRES *YATROX 4 MG 15 COMPRIMIDOS *YATROX 4 MG 6 COMPRIMIDOS *YATROX 8 MG 15 COMPRIMIDOS *YATROX 8 MG 6 COMPRIMIDOS *ZOFRAN 4 MG 15 COMPRIMIDOS *ZOFRAN 4 MG 6 COMPRIMIDOS *ZOFRAN 8 MG 15 COMPRIMIDOS *ZOFRAN 8 MG 6 COMPRIMIDOS *ZOFRAN ZYDIS 4 MG 10 LIOFILIZADOS *ZOFRAN ZYDIS 8 MG 10 LIOFILIZADOS	▪ <i>Adultos:</i> Control náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia citotóxicas y para la prevención y tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorios. ▪ <i>Población pediátrica:</i> Control de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia (NVIQ) en niños mayor o igual a 6 meses, y para la prevención y tratamiento de NVPO en niños mayor o igual a 1 mes. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
A04AA02	GRANISETRON DH	*KYTRIL 1 MG 10 COMP	▪ Prevención y tratamiento de las náuseas y vómitos, tanto agudos como diferidos, asociados con el tratamiento citostático (quimioterapia y radioterapia). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
A06AC01	ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM) FR	PLANTAGO OVATA 3,5 G POLVO EFERVESCENTE 30 SOBRES PLANTAGO OVATA 3,5 G POLVO PARA SUSPENSION, 30 SOBRES	▪ Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
A06AD11	LACTULOSA FR	DUPHALAC SOLUCION ORAL BOTELLA 200 ML DUPHALAC SOLUCION ORAL BOTELLA 800 ML DUPHALAC SOLUCION ORAL 10 SOBRES DUPHALAC SOLUCION ORAL 50 SOBRES LACTULOSA 10 G SOLUCION ORAL 10 SOBRES LACTULOSA 3,33 G/5 ML SOLUCION ORAL 200 ML LACTULOSA 3,33 G/5 ML SOLUCION ORAL 800 ML	Encefalopatía portosistémica y paraplejía. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A06AD12	LACTITOL FR	OPONAF 10 G/SOBRE 20 SOBRES OPONAF 10 G/SOBRE 50 SOBRES	Encefalopatía portosistémica y paraplejía. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A06AH01	METILNALTREXONA BROMURO FR	RELISTOR 12 MG/0,6 ML 1 VIAL SOL INYECTABLE RELISTOR 12MG/0,6ML 7 VIALES + 7 JERINGAS PRECARGADAS SOL INYECTABLE RELISTOR 12 MG/0,6 ML 7 VIALES SOL INYECTABLE	Pacientes oncológicos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A06AH03	NALOXEGOL FR	*MOVENTIG 12,5 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *MOVENTIG 25 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) en pacientes adultos oncológicos con una respuesta inadecuada a los laxantes. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
A06AH05	NALDEMEDINA FR	*RIZMOIC 200 MCG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) en pacientes adultos oncológicos con una respuesta inadecuada a los laxantes. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de Atención Primaria o Geriátrica.</i>
A06AX04	LINACLOTIDA CPD	CONSTELLA 290 MICROGRAMOS CAPSULAS DURAS FRASCO	Tratamiento sintomático del síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E) de carácter grave en adultos que no hayan respondido adecuadamente a ninguno de los tratamientos de elección del SII-E disponibles o que sean intolerantes a los mismos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de Atención Primaria o Geriátrica.</i>
A07EA06	BUDESONIDA DH	*JORVEZA 0,5 MG 60 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES *JORVEZA 1 MG 60 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES	- Tratamiento de la Esofagitis eosinofílica EEO en adultos (mayores de 18 años), no respondedores o refractarios a los inhibidores de la bomba de protones (IBP) tras, al menos, 8 semanas de tratamiento con los mismos y dieta de eliminación, y (una o ambas de las siguientes condiciones): a) Fenotipo fibro-estenotante: presencia de estenosis y anillos esofágicos demostrados por endoscopia. - y/o b) Pacientes con afectación moderada-grave: disfagia intensa y/o malnutrición, y/o impactación esofágica recurrente de alimentos, y/o estenosis esofágica de alto grado, y/o recaída sintomática/histológica rápida después de la terapia inicial, y/o perforación esofágica.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en digestivo, medicina interna y alergología.</i>
A09AA02	PANCREATINA (LIPASA, AMILASA, PROTEASA) DH	*KREON 10.000 100 CAPSULAS *KREON 10.000 250 CAPSULAS *KREON 5.000 U GRANULADO GASTRORRESISTENTE, 1 FRASCO DE 20 G *KREON 25.000 50 CAPSULAS *KREON 25.000 100 CAPSULAS	Tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC CPD	* TRESIBA 100 U/ML SOLUCION INYECTABLE , 5 PLUMAS PRECARGADAS DE 3 ML *TRESIBA 200 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE 3 PLUMAS PRECARGADAS DE 3 ML	Tratamiento de pacientes diabéticos tipo 1 y 2 adultos, adolescentes y niños a partir de 1 año, tratados con insulinas y análogos de insulina de acción prolongada que necesitan 2 inyecciones basales diarias y que se caracterizan por riesgo relativamente alto de sufrir hipoglucemias. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A10BD16	CANAGLIFLOZINA METFORMINA CPD	+ *VOKANAMET 150/1000 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS * VOKANAMET 150/850 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Tratamiento de aquellos pacientes diabéticos que con la dosis de 50/850 mg o 50/1000 mg de canagliflozina/metformina no alcanzan el control glucémico. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
A10BD19	EMPAGLIFLOZINA LINAGLIPTINA CPD	+ *GLYXAMBI 25 MG/5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *GLYXAMBI 10 MG/5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Pacientes en tratamiento con Linagliptina y Empagliflozina por separado después de haber comprobado que responden adecuadamente a los dos antidiabéticos sin asociar, es decir en aquellos en los que el tratamiento esta estabilizado y es efectivo. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A10BJ01	EXENATIDA CPD	*BYETTA 5 MCG 1 PLUMA PRECARGADA SOLUCION INYECTABLE *BYETTA 10 MCG 1 PLUMA PRECARGADA SOLUCION INYECTABLE	- Indicado para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en combinación con metformina y/o sulfonilureas, y/o tiazolidindionas en pacientes con sobrepeso cuyo índice de masa corporal sea igual o mayor a 30, que no hayan alcanzado un control glucémico adecuado con las dosis máximas toleradas de estos medicamentos orales. - Tratamiento coadyuvante a insulina basal con o sin metformina y/o pioglitazona en pacientes adultos con sobrepeso cuyo índice de masa corporal sea igual o mayor a 30, que no hayan alcanzado un adecuado control glucémico con estos medicamentos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A10BJ02	LIRAGLUTIDA CPD	*VICTOZA 6 MG/ML 2 PLUMAS PRECAR 3 ML SOLUCION INYECTABLE *LIRAGLUTIDA 6 MG/ML 2 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML	Pacientes con sobrepeso con índice de masa corporal igual o mayor a 30 kg/m2 que reúnan las indicaciones terapéuticas autorizadas del tratamiento de adultos, adolescentes y niños a partir de 10 años de edad con

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			diabetes mellitus tipo 2 para alcanzar el control glucémico en combinación con medicamentos hipoglucemiantes orales y/o insulina basal cuando estos, junto con dieta y ejercicio, no logran un control glucémico adecuado. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A10BJ03	LIXISENATIDA CPD	*LYXUMIA 20 MICROGAMOS SOLUCION INYECTABLE, 2 PLUMAS PRECARGADAS DE 14 DOSIS	Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos para alcanzar el control glucémico, en combinación con medicamentos hipoglucemiantes y/o insulina basal cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado y restringido para aquellos pacientes con Índice de Masa Corporal mayor que 30 kg/m2. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A10BJ05	DULAGLUTIDA CPD	*TRULICITY 0,75 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 4 PLUMAS PRECARGADAS *TRULICITY 1,5 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 4 PLUMAS PRECARGADAS	- Tratamiento de la diabetes mellitus 2 en adultos obesos con un índice de masa corporal mayor de 30 Kg/m2 y en terapia combinada con otros antidiabéticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado. - Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes obesos pediátricos de 10- 18 años con un índice de masa corporal igual o mayor de 30Kg/m2 y en terapia combinada con otros antidiabéticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A10BJ06	SEMAGLUTIDA CP	*OZEMPIC 1 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 PLUMA PRECARGADA DE 3 ML+4 AGUJAS *OZEMPIC 0,5 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, PLUMA PRECARGADA DE 1,5 ML *OZEMPIC 0,25 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, PLUMA PRECARGADA DE 1,5 ML *OZEMPIC 1 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 PLUMA PRECARGADA DE 3 ML+8 AGUJAS *OZEMPIC 0,5 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, PLUMA PRECARGADA DE 3ML *RYBELSUS 3 MG 30 COMPRIMIDOS *RYBELSUS 7 MG 30 COMPRIMIDOS *RYBELSUS 14 MG 30 COMPRIMIDOS *RYBELSUS 1.5 MG 30 COMPRIMIDOS *RYBELSUS 4 MG 30 COMPRIMIDOS *RYBELSUS 9 MG 30 COMPRIMIDOS	▪ Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en terapia combinada con otros antidiabéticos (no en monoterapia) exclusivamente para obesos con un índice de masa corporal mayor de 30 kg/m2. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
A10BK02	CANAGLIFLOZINA CPD	*INVOKANA 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 30 COMPRIMIDOS	Tratamiento de adultos y niños a partir de 10 años con diabetes mellitus tipo 2 no suficientemente controlada, asociado a dieta y ejercicio, añadido a otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes o en monoterapia cuando la metformina no se considera adecuada debido a intolerancia o contraindicaciones. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
A11CC03	ALFACALCIDOL DH	*ETALPHA 2 MCG/ML 10 ML GOTAS ORALES *ETALPHA 0,25 MICROGRAMOS 30 CAPSULAS BLANDAS *ETALPHA 0,5 MICROGRAMOS 30 CAPSULAS BLANDAS	Alteraciones del metabolismo del calcio y de los fosfatos debidas a una producción reducida de 1,25-dihidroxivitamina D₃ sometidos a hemodiálisis a largo plazo. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
A11CC04	CALCITRIOL DH	ROCALTROL 0,25 MCG 20 CAPSULAS ROCALTROL 0,5 MCG 20 CAPSULAS	Enfermedades relacionadas con la incapacidad de síntesis renal de 1,2 dihidroxicolecalciferol, osteodistrofia renal, hipoparatiroidismo, osteomalacia y raquitismo. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
A16AA01	CARNITINA CPD	*CARNICOR 1 G 10 VIALES BEBIBLES 10 ML *CARNICOR 30 % 40 ML SOLUCION *SECABIOOL 30 % 40 ML SOLUCION	- Déficits primarios y secundarios de L-carnitina. - Tratamiento de la encefalopatía hiperamonémica y/o hepatotoxicidad debida a sobredosis/toxicidad por ácido valpróico. - Tratamiento profiláctico en pacientes en tratamiento con ácido valpróico que presentan riesgo incrementado de hepatotoxicidad. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
		*CARNICOR 1 G 10 AMPOLLAS 5 ML	- Déficits primarios y secundarios de L-carnitina. - Tratamiento de la encefalopatía hiperamonémica y/o hepatotoxicidad debida a sobredosis/toxicidad por ácido valpróico. - Tratamiento profiláctico en pacientes en tratamiento con ácido valpróico que presentan riesgo incrementado de hepatotoxicidad. - Tratamiento de la deficiencia secundaria de L-carnitina en pacientes sometidos a hemodiálisis de largo plazo. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
B01AB11	SULODEXIDA CPD	* ATERINA 15 MG 60 CAPSULAS BLANDAS * DOVIDA 30 MG 30 CAPSULAS BLANDAS	Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica exclusivamente para pacientes en estadios C3* (*solo con edema moderado o grave de la escala VCSS) a C6 de la clasificación CEAP. La duración máxima del tratamiento son 3 meses.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
B01AC04	CLOPIDOGREL CPD	CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDOS ISCOVER 75 MG 28 COMPRIMIDOS PLAVIX 75 MG 28 COMPRIMIDOS	▪ Prevención de eventos aterotrombóticos en: ✓ Pacientes que han sufrido infarto de miocardio, infarto cerebral o arteriopatía periférica establecida. ✓ Pacientes que presentan síndrome coronario agudo: - Sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda-Q), incluyendo pacientes que se han sometido a la colocación de un stent después de una intervención coronaria percutánea, en combinación con AAS. - Infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST, en combinación con AAS en pacientes tratados médicamente de elección para terapia trombolítica. ▪ Prevención de acontecimientos aterotrombóticos y tromboembólicos en fibrilación auricular en combinación con AAS. En pacientes adultos con fibrilación auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un índice de hemorragia bajo. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
B01AC05	TICLOPIDINA DH	TICLOPIDINA 250 MG 50 COMP RECUBIERTOS	- Prevencción de las complicaciones trombóticas después de haber sufrido un primer accidente vascular cerebral de origen arterosclerótico: - En pacientes que hayan sufrido un accidente isquémico transitorio, ceguera monocular transitoria (amaurosis fugaz), déficit neurológico isquémico reversible o ictus menor. - En pacientes que hayan tenido un ictus establecido. - Prevencción de los accidentes tromboembólicos, en especial coronarios, en pacientes portadores de una arteriopatía crónica obliterante de los miembros inferiores en estado de claudicación intermitente. - Prevencción y corrección de los trastornos plaquetarios inducidos por circuitos extracorpóreos: - Cirugía con circulación extracorpórea. - Hemodiálisis crónica. - Prevencción de la progresión del número de microaneurismas en diabéticos insulino-dependientes con retinopatía inicial. - Prevencción de oclusiones tras procedimientos quirúrgicos coronarios: - En cirugía de derivación aortocoronaria. - En angioplastia coronaria transluminal percutánea con colocación de prótesis endovascular (STENT). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
B01AC22	PRASUGREL CPD	PRASUGREL 5 MG 28 COMPRIMIDOS PRASUGREL 10 MG 28 COMPRIMIDOS EFIENT 5 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG EFIENT 10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA	Co-administrado con ácido acetilsalicílico, está indicado para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes con síndrome coronario agudo o infarto de miocardio con elevación del segmento ST sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) primaria o aplazada. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
B01AC23	CILOSTAZOL DH	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDOS CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDOS EKISTOL 100 MG 56 COMPRIMIDOS EKISTOL 50 MG 56 COMPRIMIDOS	- Claudicación intermitente en aquellos pacientes en los que los cambios en el estilo de vida (abandono de hábito de fumar y programas de ejercicio físico) por si solos no hayan resultado efectivos. - Se debe evaluar el beneficio a los tres meses de instaurar el tratamiento, suspendiendo el mismo si no se observa un beneficio clínicamente relevante. - En determinados grupos de pacientes como es el caso de aquellos que también utilizan inhibidores potentes del CYP3A4 o CYP2C19 es aconsejable reducir la dosis de cilostazol a 50 mg dos veces al día. - Para la mejora de la distancia máxima recorrida y distancia recorrida sin dolor que pueden cubrir los pacientes con claudicación intermitente, que no sufren dolor en reposo y que no presentan indicios de necrosis tisular periférica (arteriopatía periférica de Fontaine en estadio II). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
B01AC24	TICAGRELOR	TICAGRELOR 60 MG 60 COMP TICAGRELOR 90 MG 56 COMP	Administrado conjuntamente con ácido acetilsalicílico (AAS), está indicado para la prevención de episodios

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
	CPD	BRILIQUE 60 MG 60 COMP RECUB PELICU BRILIQUE 90 MG 56 COMP RECUB PELICU	aterotrombóticos (problemas causados por coágulos de sangre y endurecimiento de las arterias) como infarto de miocardio o ictus. Está indicado en pacientes adultos que han sufrido un infarto de miocardio o presentan angina inestable (un tipo de dolor torácico causado por problemas con el riego sanguíneo del corazón). Uso restringido en pacientes adultos con antecedentes de infarto de miocardio (IM) como terapia de continuación del ticagrelor 90mg y con alto riesgo de desarrollar un acontecimiento aterotrombótico, es decir, con al menos uno de los siguientes factores de riesgo de aterotrombosis: edad mayor o igual a 65 años, diabetes mellitus que precisa medicación, un segundo IM anterior, evidencia de ECA (enfermedad arterial coronaria) en múltiples vasos, o disfunción renal crónica en fase no terminal. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
B01AC30	CLOPIDOGREL + ACIDO ACETILSALICILICO CPD	CLOPIDOGREL/ACIDO ACETILSALICILICO 75 MG/75 MG COMPRIMIDOS CLOPIDOGREL/ACIDO ACETILSALICILICO 75 MG/100 MG COMPRIMIDOS DUOPLAVIN 75/100 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Indicado para la prevención de acontecimientos aterotrombóticos en pacientes adultos que ya están tomando clopidogrel y ácido acetilsalicílico (AAS), es una combinación de medicamentos a dosis fijas para el tratamiento de continuación en: ✓ Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent después de una intervención coronaria percutánea.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			✓ Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolítica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO CPD	*DABIGATRAN ETEXILATO 75 MG 60 CAPSULAS DURAS *DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG 10 CAPSULAS DURAS *DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG 30 CAPSULAS DURAS *DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG 60 CAPSULAS DURAS *DABIGATRAN ETEXILATO 150 MG CAPSULAS DURAS *PRADAXA 75 MG CAPSULAS DURAS *PRADAXA 110 MG 10 CAPSULAS DURAS *PRADAXA 110 MG 30 CAPSULAS DURAS *PRADAXA 110 MG 60 CAPSULAS DURAS *PRIVENAX 75 MG CAPSULAS DURAS *PRIVENAX 110 MG 30 CAPSULAS DURAS *PRIVENAX 110 MG 60 CAPSULAS DURAS	▪ Prevención de episodios tromboembólicos en cirugía programada de reemplazo completo de: – Rodilla – Cadera <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en traumatología.</i>
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO CPD	*DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG 10 CAPSULAS DURAS *DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG 30 CAPSULAS DURAS *DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG 60 CAPSULAS DURAS *PRADAXA 110 MG CAPSULAS DURAS *PRADAXA 150 MG CAPSULAS DURAS *PRIVENAX 110 MG CAPSULAS DURAS *PRIVENAX 150 MG CAPSULAS DURAS	▪ Prevención de ictus y embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular, con uno o más factores de riesgo tales como: ictus o ataque isquémico transitorio previo; insuficiencia cardíaca ≥ Clase 2 escala NYHA; edad ≥ 75 años; diabetes mellitus; hipertensión. Criterios de inclusión: ✓ Paciente con hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso de warfarina o acenocumarol.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			✓ Paciente con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC) en los que los beneficios de la anticoagulación superan el riesgo hemorrágico. ✓ Paciente con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC, definido como la combinación de HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los siguientes: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados corticales múltiples. ✓ Paciente con tratamiento con un antagonista de la vitamina K que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de INR. ✓ Paciente que ha iniciado tratamiento con un antagonista de la vitamina K en el que no es posible mantener un control de INR dentro de rango (2-3) a pesar de un buen cumplimiento terapéutico. Se considerará que el control de INR es inadecuado cuando el porcentaje de tiempo en rango terapéutico (TRT) sea inferior al 65 % (Método Rosendaal) o cuando el porcentaje de valores de INR dentro de rango terapéutico sea inferior al 60 %. En cualquiera de los supuestos, el periodo de valoración es de al menos los últimos 6 meses excluyendo el primer mes de tratamiento para el ajuste inicial de la dosis. ✓ Imposibilidad de acceso al control del INR del paciente. ▪ Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en adultos.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en cardiología, medicina interna, hematología, neurología, nefrología, neumología, médico de atención primaria o geriátrica, cirugía vascular-angiología.</i>
B01AF01	RIVAROXABAN CPD	*XARELTO 10 MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *XARELTO 10 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 10 MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 10 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 10 MG 10 CÁPSULAS *RIVAROXABAN 10 MG 30 CÁPSULAS	- Prevencción del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en traumatología.</i> - Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en adultos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en cardiología, medicina interna, hematología, neurología, nefrología, neumología, médico de atención primaria o geriátrica, cirugía vascular-angiología.</i>
		*XARELTO 15 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *XARELTO 20 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 15 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 15 MG 42 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 20 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 20 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RIVAROXABAN 15 MG 28 CÁPSULAS *RIVAROXABAN 15 MG 42 CÁPSULAS *RIVAROXABAN 20 MG 28 CÁPSULAS	- Prevencción de ictus y embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular, con uno o más factores de riesgo tales como: ictus o ataque isquémico transitorio previo; insuficiencia cardíaca congestiva; edad ≥ 75 años; diabetes mellitus; hipertensión. Criterios de inclusión: ✓ Paciente con hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso de warfarina o acenocumarol.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			✓ Paciente con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC) en los que los beneficios de la anticoagulación superan el riesgo hemorrágico. ✓ Paciente con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC, definido como la combinación de HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los siguientes: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados corticales múltiples. ✓ Paciente con tratamiento con un antagonista de la vitamina K que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de INR. ✓ Paciente que ha iniciado tratamiento con un antagonista de la vitamina K en el que no es posible mantener un control de INR dentro de rango (2-3) a pesar de un buen cumplimiento terapéutico. Se considerará que el control de INR es inadecuado cuando el porcentaje de tiempo en rango terapéutico (TRT) sea inferior al 65 % (Método Rosendaal) o cuando el porcentaje de valores de INR dentro de rango terapéutico sea inferior al 60 %. En cualquiera de los supuestos, el periodo de valoración es de al menos los últimos 6 meses excluyendo el primer mes de tratamiento para el ajuste inicial de la dosis. ✓ Imposibilidad de acceso al control del INR del paciente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en cardiología, medicina interna, traumatología, hematología, neurología, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en adultos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en cardiología, medicina interna, hematología, neurología, nefrología, neumología, médico de atención primaria o geriátrica, cirugía vascular-angiología.</i>
B01AF02	APIXABAN CPD	*ELIQUIS 2,5 MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (10 COMPRIMIDOS/ BLISTER) *ELIQUIS 2,5 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (10 COMPRIMIDOS/ BLISTER)	- Prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla. - Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) con uno o más factores de riesgo tales como ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; hipertensión; diabetes mellitus; insuficiencia cardíaca sintomática (mayor o igual clase 2 escala NYHA). Criterios de inclusión: ✓ Paciente con hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso de warfarina o acenocumarol. ✓ Paciente con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC) en los que los beneficios de la anticoagulación superan el riesgo hemorrágico. ✓ Paciente con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC, definido como la combinación de HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			siguientes: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados corticales múltiples. ✓ Paciente con tratamiento con un antagonista de la vitamina K que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de INR. ✓ Paciente que ha iniciado tratamiento con un antagonista de la vitamina K en el que no es posible mantener un control de INR dentro de rango (2-3) a pesar de un buen cumplimiento terapéutico. Se considerará que el control de INR es inadecuado cuando el porcentaje de tiempo en rango terapéutico (TRT) sea inferior al 65 % (Método Rosendaal) o cuando el porcentaje de valores de INR dentro de rango terapéutico sea inferior al 60 %. En cualquiera de los supuestos, el periodo de valoración es de al menos los últimos 6 meses excluyendo el primer mes de tratamiento para el ajuste inicial de la dosis. ✓ Imposibilidad de acceso al control del INR del paciente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en cardiología, medicina interna, traumatología, hematología, neurología, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
B01AF02	APIXABAN CPD	*ELIQUIS 5 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Prevencción del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) con uno o más factores de riesgo tales como ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; hipertensión; diabetes mellitus; insuficiencia cardíaca sintomática (mayor o igual clase 2 escala NYHA). Criterios de inclusión: ✓ Paciente con hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso de warfarina o acenocumarol. ✓ Paciente con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC) en los que los beneficios de la anticoagulación superan el riesgo hemorrágico. ✓ Paciente con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC, definido como la combinación de HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los siguientes: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados corticales múltiples. ✓ Paciente con tratamiento con un antagonista de la vitamina K que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de INR. ✓ Paciente que ha iniciado tratamiento con un antagonista de la vitamina K en el que no es posible mantener un control de INR dentro de rango (2-3) a pesar de un buen cumplimiento terapéutico. Se considerará que el control de INR es inadecuado cuando el porcentaje de tiempo en rango terapéutico (TRT) sea inferior al 65 % (Método Rosendaal) o cuando el porcentaje de valores de INR dentro de rango terapéutico sea inferior al 60 %. En cualquiera

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			de los supuestos, el periodo de valoración es de al menos los últimos 6 meses excluyendo el primer mes de tratamiento para el ajuste inicial de la dosis. ✓ Imposibilidad de acceso al control del INR del paciente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en cardiología, medicina interna, hematología, neurología, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
B01AF03	EDOXABAN CPD	* LIXIANA 15 MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA * LIXIANA 30 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA * LIXIANA 60 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Prevenición del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) con uno o más factores de riesgo tales como insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad mayor o igual a 75 años, diabetes mellitus, ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos. Criterios de inclusión: ✓ Paciente con hipersensibilidad conocida o con contraindicación específica al uso de warfarina o acenocumarol. ✓ Paciente con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC) en los que los beneficios de la anticoagulación superan el riesgo hemorrágico. ✓ Paciente con ictus isquémico que presenten criterios clínicos y de neuroimagen de alto riesgo de HIC, definido como la combinación de HAS-BLED ≥ 3 y al menos uno de los siguientes: leucoaraiosis grado III-IV y/o microsangrados corticales múltiples. ✓ Paciente con tratamiento con un antagonista de la vitamina K que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de un buen control de INR.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			✓ Paciente que ha iniciado tratamiento con un antagonista de la vitamina K en el que no es posible mantener un control de INR dentro de rango (2-3) a pesar de un buen cumplimiento terapéutico. Se considerará que el control de INR es inadecuado cuando el porcentaje de tiempo en rango terapéutico (TRT) sea inferior al 65 % (Método Rosendaal) o cuando el porcentaje de valores de INR dentro de rango terapéutico sea inferior al 60 %. En cualquiera de los supuestos, el periodo de valoración es de al menos los últimos 6 meses excluyendo el primer mes de tratamiento para el ajuste inicial de la dosis. ✓ Imposibilidad de acceso al control del INR del paciente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en cardiología, medicina interna, traumatología, hematología, neurología, nefrología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
C01BD07	DRONEDARONA DH	*MULTAQ 400 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *DRONEDARONA 400 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	▪ Mantenimiento del ritmo sinusal después de una cardioversión efectiva en pacientes adultos y clínicamente estables con fibrilación auricular paroxística o persistente. Por su perfil de seguridad, debe prescribirse solo después de que otras opciones alternativas de tratamiento hayan sido consideradas. No debe administrarse a pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda ni a pacientes con episodios anteriores o actuales de insuficiencia cardíaca. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en cardiología y medicina interna.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
C01DX22	VERICIGUAT CPD	*VERQUVO 2,5 MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *VERQUVO 5 MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *VERQUVO 10 MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *VERQUVO 10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos con fracción de eyección reducida, menor de 40 %, que hayan presentado descompensaciones recientes con necesidad de diurético intravenoso a pesar de tratamiento médico óptimo y que tras la descompensación se encuentren estables y euvolémicos, con especial precaución en pacientes de edad avanzada, por la mayor susceptibilidad de efectos adversos en este grupo y por un posible menor beneficio en eficacia. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
C02AC02	GUANFACINA DH	*GUANFACINA 1 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA * GUANFACINA 2 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA * GUANFACINA 3 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA * GUANFACINA 4 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA * GUANFACINA 5 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA * GUANFACINA 6 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA * GUANFACINA 7 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA	Tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes de 6 a 17 años, como alternativa, cuando los estimulantes del Sistema Nervioso Central (metilfenidato y anfetaminas) y la atomoxetina, no sean eficaces o estén contraindicados. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría o neurología o neuropediatría. Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por el psiquiatra, neurólogo o neuropediatra.</i>
C03DA05	FINERENONA CPD	*KERENDIA 10 MG *KERENDIA 20 MG	Tratamiento en pacientes adultos de la enfermedad renal crónica (filtrado glomerular estimado mayor o igual a 25 ml/min/1.73 m²) asociada a diabetes tipo 2, que cumplan

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			los criterios de Ratio Albumina Creatinina en orina [RAC] superior o igual a 30 mg/g, y no estén controlados pese al tratamiento con dosis estables optimizadas de IECA o ARA2 y/o iSGLT2, o que presenten intolerancia a IECA o ARA2 o bien a iSGLT2. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en medicina interna, nefrología, endocrinología, cardiología o médico de atención primaria.</i>
C04AX21	NAFTIDROFURIL FR	PRAXILENE 100 MG 50 CAPSULAS	Claudicación intermitente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
C10AA01	SIMVASTATINA	SIMVASTATINA 40 MG 28 COMPRIMIDOS SIMVASTATINA 20 MG 28 COMPRIMIDOS SIMVASTATINA 10 MG 28 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10AA02	LOVASTATINA	LOVASTATINA 20 MG 28 COMPRIMIDOS LOVASTATINA 40 MG 30 COMPRIMIDOS LOVASTATINA 20 MG 30 COMPRIMIDOS LOVASTATINA 40 MG 28 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10AA03	PRAVASTATINA	PRAVASTATINA 40 MG 28 COMPRIMIDOS PRAVASTATINA 10 MG 28 COMPRIMIDOS PRAVASTATINA 20 MG 28 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
C10AA04	FLUVASTATINA	FLUVASTATINA 80 MG 28 COMP LIBERACION PROLO FLUVASTATINA 20 MG 28 CAPSULAS FLUVASTATINA 40 MG 28 CAPSULAS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10AA05	ATORVASTATINA	ATORVASTATINA 10 MG 28 COMPRIMIDOS ATORVASTATINA 20 MG 28 COMPRIMIDOS ATORVASTATINA 30 MG 28 COMPRIMIDOS ATORVASTATINA 40 MG 28 COMPRIMIDOS ATORVASTATINA 60 MG 28 COMPRIMIDOS ATORVASTATINA 80 MG 28 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10AA07	ROSUVASTATINA CPD	ROSUVASTATINA 30 MG COMPRIMIDOS ALZIL 30 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA ARROX 30 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Uso restringido para pacientes con hipercolesterolemia severa con alto riesgo cardiovascular (especialmente pacientes con hipercolesterolemia familiar) que no alcancen sus objetivos de tratamiento con 20 mg, y en los que se llevara a cabo un seguimiento rutinario bajo la supervisión del especialista. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i> - Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
C10AA07	ROSUVASTATINA	ROSUVASTATINA 5 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ROSUVASTATINA 10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ROSUVASTATINA 15 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ROSUVASTATINA 20 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10AA08	PITAVASTATINA	PITAVASTATINA 2 MG 28 COMPRIMIDOS PITAVASTATINA 4 MG 28 COMPRIMIDOS PITAVASTATINA 1 MG 28 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10AC04	COLESEVELAM HIDROCLORURO CPD	CHOLESTAGEL 625 MG 180 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- En combinación con un inhibidor de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa (estatina), está indicado como tratamiento coadyuvante a la dieta para proporcionar una reducción adicional en las concentraciones de colesterol de lipoproteína de baja densidad (C-LDL) en aquellos pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria que no están controlados adecuadamente solo con estatina. - Como monoterapia, está indicado como tratamiento coadyuvante a la dieta para la reducción del colesterol total y del C-LDL elevados, en pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria para los que el tratamiento con estatinas es inapropiado o no es bien tolerado. - Se puede utilizar junto con ezetimiba, con o sin estatina, en pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria incluyendo a los pacientes con hipercolesterolemia familiar. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10AX06	OMEGA-3-TRIGLICERIDOS FR	ACIDOS OMEGA 3 1000 MG CAPSULAS OMACOR 1000 MG CAPSULAS BLANDAS	Pacientes con hipertrigliceridemia grave (≥ 500 mg/dl) en los que los fibratos están contraindicados. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
C10AX09	EZETIMIBA	EZETIMIBA 10 MG 28 COMPRIMIDOS EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS, 28 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10AX15	ACIDO BEMPEDOICO CPD	NILEMDO 180 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HFHe) no controlados con la dosis máxima de estatina + ezetimiba, o con ezetimiba en caso de intolerancia o contraindicación a estatinas. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i> - Adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (EVA) no controlados con la dosis máxima de estatina+ezetimiba, o con ezetimiba en caso de intolerancia o contraindicación a estatinas.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriatría.</i>
C10AX50	ICOSAPENTO DE ETILO CPD	VAZKEPA 998 MG 120 CAPSULAS BLANDAS	- Reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes adultos con diagnóstico de enfermedad arteriosclerótica* y con un riesgo alto de eventos cardiovasculares, con tratamiento optimizado y valores de C-LDL de entre > 40 mg/dL y ≤ 100 mg/dL y en los que los valores de TG persisten elevados (> 150 mg/dl) a pesar del tratamiento con estatinas +/- otros hipolipemiantes a dosis máximas toleradas. * Enfermedad arteriosclerótica: - Síndrome coronario agudo (como infarto de miocardio o angina inestable) necesitando hospitalización), o - Procedimientos de revascularización coronaria u otras arterias, - Enfermedad coronaria crónica, o - ACV isquémico, o - Enfermedad arterial periférica <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
C10BA02	SIMVASTATINA EZETIMIBA	+ EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 MG 28 COMPRIMI EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/40 MG 28 COMPRIMI VYTORIN 10/20 MG 28 COMPRIMIDOS VYTORIN 10/40 MG 28 COMPRIMIDOS INEGY 10/20 MG 28 COMPRIMIDOS INEGY 10/40 MG 28 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO		NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
C10BA03	PRAVASTATINA FENOFIBRATO	+	PRAVASTATINA/FENOFIBRATO 40/160 MG 30 CAPS PRAVAFENIX 40 MG/160 MG CAPS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10BA05	ATORVASTATINA EZETIMIBA	+	ATORVASTATINA/EZETIMIBA 10/10 MG 30 COMPRIMIDOS ATORVASTATINA/EZETIMIBA 20/10 MG 30 COMPRIMIDOS ATORVASTATINA/EZETIMIBA 40/10 MG 30 COMPRIMIDOS ATORVASTATINA/EZETIMIBA 80/10 MG 30 COMPRIMIDOS ATORDUO 10 MG/10 MG 30 CAPSULAS DURAS ATORDUO 20 MG/10 MG 30 CAPSULAS DURAS ATORDUO 40 MG/10 MG 30 CAPSULAS DURAS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10BA06	ROSUVASTATINA EZETIMIBA CPD	+	VAXAR PLUS 30/10 MG COMPRIMIDOS	- Tratamiento de la hipercolesterolemia primaria en pacientes en tratamiento previo y controlados con rosuvastatina 30 mg y ezetimiba 10 mg. - En prevención de eventos cardiovasculares en pacientes en tratamiento previo y controlados con rosuvastatina 30 mg y ezetimiba 10 mg. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i> - Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO		NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
C10BA06	ROSUVASTATINA EZETIMIBA CPD	+	ALZIL PLUS 40/10 MG 30 COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA VAXAR PLUS 40/10 MG 30 COMPRIMIDOS ARROX PLUS 40/10 MG 30 COMPRIMIDOS TWICOR 40/10MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Tratamiento de la hipercolesterolemia primaria en pacientes adultos en tratamiento previo y no controlados con rosuvastatina 30 mg y ezetimiba 10 mg. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i> - Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10BA06	ROSUVASTATINA EZETIMIBA	+	ROSUVASTATINA/EZETIMIBA 5/10 MG 30 CAPSULAS ROSUVASTATINA/EZETIMIBA 10/10 MG 30 CAPSULAS ROSUVASTATINA/EZETIMIBA 20/10 MG 30 CAPSULAS ROSUVASTATINA/EZETIMIBA 5/10 MG 30 COMPRIMIDOS ROSUVASTATINA/EZETIMIBA 10/10 MG 30 COMPRIMIDOS ROSUVASTATINA/EZETIMIBA 20/10 MG 30 COMPRIMIDOS ZENON 10 MG/10 MG 30 COMPRIMIDOS ZENON 20 MG/10 MG 30 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10BA09	ROSUVASTATINA FENOFIBRATO	+	FENZIL 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS FENZIL 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS FENZIL 20 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ROFEMAX 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ROFEMAX 20 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTO ROFEMAX 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTO	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
C10BA10	ACIDO BEMPEDOICO + EZETIMIBA CPD	NUSTENDI 180/10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HFHe) no controlados con la dosis máxima de estatina + ezetimiba, o con ezetimiba en caso de intolerancia o contraindicación a estatinas. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i> - Adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (EVA) no controlados con la dosis máxima de estatina+ezetimiba, o con ezetimiba en caso de intolerancia o contraindicación a estatinas. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriatría.</i>
C10BA13	PITAVASTATINA EZETIMIBA	+ EZELPIX 4 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS EZELPIX 2 MG/10 MG CAPSULAS DURAS, 30 CAPSULAS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10BX03	ATORVASTATINA AMLODIPINO	+ AMLODIPINO/ATORVASTATINA 10 MG/10 MG 28 COMP	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10BX05	ROSUVASTATINA + ACIDO ACETILSALICILICO	ROASAX 5 MG/100 MG 30 CAPSULAS DURAS ROASAX 10 MG/100 MG 30 CAPSULAS DURAS ROASAX 20 MG/100 MG 30 CAPSULAS DURAS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
C10BX06	ATORVASTATINA + RAMIPRILO + ACIDO ACETILSALICILICO	AC ACETILSALICILICO / ATORVASTATINA / RAMIPRIL 100/20/10 MG 28 COMPRIMIDOS AC ACETILSALICILICO / ATORVASTATINA / RAMIPRIL 100/20/2,5 MG 28 COMPRIMIDOS AC ACETILSALICILICO / ATORVASTATINA/RAMIPRIL 100/20/5 MG 28 COMPRIMIDOS AC ACETILSALICILICO / ATORVASTATINA / RAMIPRIL 100/40/2,5 MG 28 COMPRIMIDOS AC ACETILSALICILICO / ATORVASTATINA / RAMIPRIL 100/40/5 MG 28 COMPRIMIDOS AC ACETILSALICILICO / ATORVASTATINA / RAMIPRIL 100/40/10 MG 28 COMPRIMIDOS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>
C10BX09	ROSUVASTATINA + AMLODIPINO	ROSUVASTATINA/AMLODIPINO 10/5 MG 30 CAPSULAS DURAS ROSUVASTATINA/AMLODIPINO 10/10 MG 30 CAPSULAS DURAS ROSUVASTATINA/AMLODIPINO 20/5 MG 30 CAPSULAS DURAS ROSUVASTATINA/AMLODIPINO 20/10 MG 30 CAPSULAS DURAS	Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología y medicina interna.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
D05BB02	ACITRETINA DH	*ACITRETINA 10 MG 30 CAPSULAS DURAS *ACITRETINA 25 MG 30 CAPSULAS DURAS	Psoriasis, ictiosis y liquen rojo. Otras formas graves y refractarias de dermatitis caracterizadas por disqueratosis y/o hiperqueratosis. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en dermatología.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por el dermatólogo.</i>
		*NEOTIGASON 10 MG 30 CAPSULAS *NEOTIGASON 25 MG 30 CAPSULAS	Psoriasis, ictiosis y enfermedad de Darier. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en dermatología.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por el dermatólogo.</i>
D10BA01	ISOTRETINOINA DH	ISOTRETINOINA 5 MG 50 CAPSULAS BLANDAS ISOTRETINOINA 10 MG 50 CAPSULAS ISOTRETINOINA 20 MG 50 CAPSULAS BLANDAS ISOTRETINOINA 30 MG 30 CAPSULAS BLANDAS ISOTRETINOINA 30 MG 50 CAPSULAS BLANDAS ISOTRETINOINA 40 MG 30 CAPSULAS	Formas graves de acné (por ejemplo, acné nodular o conglobata o acné con riesgo de cicatrización permanente) resistente a los ciclos adecuados de tratamiento convencional con preparados antibacterianos por vía general y por vía tópica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en dermatología.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por el dermatólogo.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
D11AH04	ALITRETINOINA DH	ALITRETINOINA 10 MG CAPSULAS ALITRETINOINA 30 MG CAPSULAS TOCTINO 10 MG CAPSULAS TOCTINO 30 MG CAPSULAS	Indicado en adultos con eczema crónico grave de las manos que no responde al tratamiento con corticosteroides tópicos potentes. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en dermatología.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por el dermatólogo.</i>
G02CX06	FEZOLINETANT CPD	VEOZA 45 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Tratamiento de los síntomas vasomotores (SVM) de moderados a graves asociados a la menopausia en mujeres que llevan 12 meses sin menstruación o con ausencia de menstruación durante al menos 12 meses y que cumplen lo siguiente: Mujeres con contraindicación al uso de terapia hormonal, bien inicial y/o por causas sobrevenidas por historia de cáncer de mama, tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha de los mismos (p.ej. alto riesgo de cáncer de endometrio), sangrado vaginal inexplicable, enfermedad coronaria, enfermedad tromboembólica arterial (p. ej., angina de pecho, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio), tromboembolismo venoso (TEV) idiopático o antecedentes del mismo (trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar), hipersensibilidad a la terapia con estrógenos y progesterona o a cualquiera de los excipientes, o porfiria.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
G03AC08	ETONOGESTREL DH	IMPLANON NXT 68 MG 1 IMPLANTE CON APLICADOR	Anticoncepción en mujeres entre 18 y 40 años de edad. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en ginecología.</i>
G03CC07	ESTROGENOS CONJUGADOS + BAZEDOXIFENO CPD	*DUAVIVE 0,45 MG/20 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA	Tratamiento en segunda línea para el manejo de los síntomas asociados a la deficiencia de estrógenos en mujeres que no son candidatas a una terapia con progestágenos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
G03GA01	GONADOTROFINA CORIONICA DH	*GONASI KIT 5.000 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE , 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA CON DISOLVENTE	En mujeres con anovulación u oligovulación para desencadenar la ovulación y la inducción de la luteinización tras la estimulación del desarrollo folicular. Para un programa de Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) como la fecundación in vitro: desencadenamiento de la maduración folicular final y de la luteinización tras la estimulación del desarrollo folicular. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado. Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
G03GA02	HORMONA FOLICULOESTIMULANTE /HORMONA LUTEINIZANTE DH	*MENOPUR 10 AMPOLLAS *MENOPUR 1200 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, JERINGA PARA INYECCION 9 + JERING. PRECAR 2 + VIAL *MENOPUR 5 AMPOLLAS *MENOPUR 600 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, JERINGA PARA INYECCION 9 + JERINGA PRECARG + VIAL	- Esterilidad en mujeres con insuficiencia ovárica hipo o normogonadotrópica: estimulación del crecimiento folicular. - Esterilidad en hombres con hipogonadismo hipo o normogonadotrópico: en combinación con hCG para estimular la espermatogénesis. - Tratamiento de esterilidad en mujeres en la siguiente situación clínica: hiperestimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples en técnicas de reproducción asistida (TRA) (p.ej. fecundación in vitro/ transferencia embrionaria (FIV/TE), transferencia intratubárica de gametos (GIFT) e inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI)). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>
		*MERIOFERT KIT 75 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 VIAL *MERIOFERT KIT 75 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 10 VIALES *MERIOFERT KIT 150 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 VIAL *MERIOFERT KIT 150 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 10 VIALES *MERIOFERT KIT 900 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUC	- En caso de anovulación (incluyendo la enfermedad del ovario poliquístico, PCOD) en mujeres que deseen concebir y que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. - Hiperestimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples en técnicas de reproducción asistida (TRA). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
G03GA04	UROFOLITROPINA DH	*FOTIPUR 75 UI/ML 1 VIAL Y 1 AMPOLLA POLVO Y DISOLVENTE PARA SOL INYECTABLE *FOTIPUR 75 UI/ML 10 VIALES Y 10 AMPOLLAS POLVO Y DISOLVENTE PARA SOL INYECTABLE *FOTIPUR 150 UI/ML 1 VIAL Y 1 AMPOLLA POLVO Y DISOLVENTE PARA SOL INYECTABLE *FOTIPUR 150 UI/ML 10 VIALES Y 10 AMPOLLAS POLVO Y DISOLVENTE PARA SOL INYECTABLE	- En caso de anovulación (incluyendo la enfermedad del ovario poliquístico, PCOD) en mujeres que deseen concebir y que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. - Hiperestimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples en técnicas de reproducción asistida (TRA), como la fertilización in vitro (FIV), transferencia intratubárica de gametos (TIG) y transferencia intratubárica de cigotos (TIZ). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
G03GA05	HORMONA FOLICULOESTIMULANTE ALFA DH	*BEMFOLA 150 UI/0,25 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA *BEMFOLA 75 UI/0,125 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA *BEMFOLA 450 UI/0,75 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA *BEMFOLA 150 UI/0,25 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA *BEMFOLA 150 UI/0,25 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 5 PLUMAS PRECARGADAS POR ENVASE *BEMFOLA 300 UI/0,50 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA *BEMFOLA 75 UI/0,125 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA *BEMFOLA 225 UI/0,375 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA *BEMFOLA 225 UI/0,375 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 5 PLUMAS PRECARGADAS POR ENVASE *BEMFOLA 300 UI/0,50 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA *BEMFOLA 300 UI/0,50 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 5 PLUMAS PRECARGADAS POR ENVASE	- En caso de anovulación (incluyendo la enfermedad del ovario poliquístico, PCOD) en mujeres que deseen concebir y que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. - Estimulación del desarrollo folicular múltiple en mujeres sometidas a superovulación para practicar técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, fertilización "in vitro" (FIV), transferencia intratubárica de gametos (GIFT), transferencia intratubárica de cigotos (ZIFT). - Administrado de forma concomitante con gonadotropina coriónica humana (Hcg) en la estimulación de la espermatogénesis en varones con hipogonadismo hipogonadotropo congénito o adquirido. - Asociado a un preparado de hormona luteinizante (LH), se recomienda para la estimulación del desarrollo folicular en mujeres con déficit severo de LH y FSH. En los ensayos clínicos, estas pacientes se definieron por un nivel sérico de LH endógena de <1,2 UI/l. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*GONAL-F 1050 UI/1,75 ML (77 MCG/1,75 ML) 1 VIAL + 1 JER PREC SOL INY *GONAL-F 300 UI/0,5 ML 1 PLUMA PRECARGADA + 5 AGUJAS SOL INY *GONAL-F 450 UI/0,75 ML 1 PLUMA PRECARGADA + 7 AGUJAS SOL INY * GONAL-F 150 UI/0,25 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 1 PLUMA PRECARGADA + 4 AGUJAS *GONAL-F 900 UI/1,5 ML (66 MCG/1,5 ML) SOL INYECT 1 PLUMA PREC + 14 AGUJAS * OVALEAP 300 UI / 0.5 ML SOLUCION INYECTABLE 300 IU/0,5 ML 1 CARTUCHO Y 10 AGUJAS PARA INYECCION * OVALEAP 450 UI / 0,75 ML SOLUCION INYECTABLE 450 IU/0,75 ML 1 CARTUCHO Y 10 AGUJAS PARA INYECCION * OVALEAP 900 UI / 1,5 ML SOLUCION INYECTABLE 900 UI / 1,5 ML 1 CARTUCHO Y 20 AGUJAS PARA INYECCION	▪ En caso de anovulación (incluyendo la enfermedad del ovario poliquístico, PCOD) en mujeres que deseen concebir y que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. ▪ Estimulación del desarrollo folicular múltiple en mujeres sometidas a superovulación para practicar técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, fertilización "in vitro" (FIV), transferencia intratubárica de gametos (GIFT), transferencia intratubárica de cigotos (ZIFT). ▪ En el varón: Espermatogénesis deficiente debido a hipogonadismo hipogonadotrófico. ▪ Asociado a un preparado de hormona luteinizante (LH), está indicado para la estimulación del desarrollo folicular en mujeres con deficiencia grave de LH y FSH. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
G03GA06	HORMONA FOLICULOESTIMULANTE BETA DH	*PUREGON 100 UI/0,5 ML 10 VIALES SOLUCIÓN INYECTABLE *PUREGON 300 UI/0,36 ML 1 CARTUCHO + 6 AGUJAS SOLUCIÓN INYECTABLE *PUREGON 600 UI/0,72 ML 1 CARTUCHO + 6 AGUJAS SOLUCIÓN INYECTABLE *PUREGON 900 UI/1,08 ML 1 CARTUCHO + 9 AGUJAS SOLUCIÓN INYECTABLE	- En caso de anovulación (incluyendo la enfermedad del ovario poliquístico, PCOD) en mujeres que deseen concebir y que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. - Estimulación del desarrollo folicular múltiple en mujeres sometidas a superovulación para practicar técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, fertilización "in vitro" (FIV), transferencia intratubárica de gametos (GIFT), inyección intracitoplasmática de esperma (ICSI). - Espermatogénesis deficiente debida a hipogonadismo hipogonadotrófico. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>
G03GA07	LUTROPINA ALFA DH	*LUVERIS 75 UI/VIAL 10 INYECTABLES 1 ML *LUVERIS 450UI SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 PLUMA PRECARGADA DE 0,72 ML +12 AGUJAS (BAJA: I/2015)	Lutropina alfa, asociado a un preparado de hormona folículo estimulante (FSH), se recomienda para la estimulación del desarrollo folicular en mujeres con déficit severo de LH y FSH. En los ensayos clínicos, estas pacientes se definieron por un nivel sérico de LH endógena de < 1,2 UI/L. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
G03GA08	CORIOGONADOTROPINA ALFA DH	*OVITRELLE 250 MCG SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA	- Mujeres sometidas a superovulación para practicar técnicas de reproducción asistida, tales como la fertilización in vitro (FIV): se administra para desencadenar la maduración folicular final y la luteinización tras la estimulación del desarrollo folicular. - Mujeres con anovulación u oligo-ovulación: Se administra para desencadenar la ovulación y la luteinización en mujeres con anovulación u oligo-ovulación tras la estimulación del desarrollo folicular. <i>Para la indicación del tratamiento de la infertilidad, informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>
G03GA10	FOLITROPINA DELTA DH	* REKOVELLE 12 MICROGRAMOS/0,36 ML PLUMA PRECARGADA 1 CARTUCHO DE 0,36 ML + 3 AGUJAS *REKOVELLE 36 MICROGRAMOS/1,08 ML PLUMA PRECARGADA 1 CARTUCHO DE 1,08 ML + 6 AGUJAS * REKOVELLE 72 MICROGRAMOS/2,16 ML PLUMA PRECARGADA 1 CARTUCHO DE 2,16 ML + 9 AGUJAS	Estimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples en mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida (TRA) tales como fecundación in vitro (FIV) o ciclo de inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>
G03GA09	CORIFOLITROPINA ALFA DH	*ELONVA 100 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE, 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML *ELONVA 150 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE, 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML	Tratamiento de varones adolescentes (14 años en adelante) con hipogonadismo hipogonadotrófico, en combinación con gonadotropina coriónica humana (hCG).

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			Estimulación ovárica controlada en combinación con un antagonista de la GnRH para el desarrollo de folículos múltiples en técnicas de reproducción asistida (TRA). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>
G03GA91	LUTROPINA ALFA + FOLITROPINA ALFA DH	*PERGOVERIS 150 UI/75 UI 10 VIALES POLVO+10 VIALES DISOLVENTE *PERGOVERIS 150 UI/75 UI 1 VIAL POLVO+1 VIAL DISOLVENTE SOLUCIÓN INYECTABLE *PERGOVERIS 150 UI/75 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE , 3 VIALES + 3 VIALES DE DISOLVENTE * PERGOVERIS (450 UI + 225 UI)/0,72 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 PLUMA PRECARGADA DE 0,72 ML + 7 AGUJAS * PERGOVERIS (300 UI + 150 UI)/0,48 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 PLUMA PRECARGADA DE 0,48 ML + 5 AGUJAS * PERGOVERIS (900 UI + 450 UI)/1,44 ML SOLUCION INYECTABLES EN PLUMA PRECARGADA, 1 PLUMA PRECARGADA DE 1,44 ML + 14 AGUJAS	En mujeres con déficit severo de LH y FSH para la estimulación del desarrollo folicular. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>
G03XB02	ULIPRISTAL CPD	*ESMYA 5 MG 28 COMPRIMIDOS	Tratamiento intermitente de los síntomas de moderados a graves de los miomas uterinos en mujeres adultas que no han alcanzado la menopausia cuando la embolización de miomas uterinos y/o las opciones de tratamiento quirúrgico

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			no son adecuadas o han fracasado.(Nota de seguridad AEMPS 12/4/21). De acuerdo con la posología la duración del tratamiento queda limitada a periodos de hasta 3 meses de duración cada uno. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en ginecología.</i> <u>Alerta de Seguridad de la AEMPS (12 de abril de 2021)</u> Esmya®: levantamiento de la suspensión de comercialización, con restricciones en sus indicaciones debido al riesgo de daño hepático grave. https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/esmya-acetato-de-ulipristal-5-mg-levantamiento-de-la-suspension-de-comercializacion-con-restricciones-en-sus-indicaciones-debido-al-riesgo-de-dano-hepatico-grave/
G04BE01	ALPROSTADILO DH	CAVERJECT 20 MCG 1 VIAL CAVERJECT 10 MCG 1 VIAL	Tratamiento de la disfunción eréctil. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en urología.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		MUSE 500 MCG, 1 SOBRE (1 APLICADOR) MUSE 1000 MCG, 1 SOBRE (1 APLICADOR)	- Tratamiento de la disfunción eréctil. - Coadyuvante de otras pruebas para el diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en urología.</i>
G04BE01	ALPROSTADILO CPD	VIRIREC 3 MG/G CREMA , 4 APLICADORES DE UN SOLO USO (APLICADOR POR BOLSA)	Tratamiento de hombres mayores o igual a 18 años de edad con disfunción eréctil, con incapacidad para obtener o mantener una erección adecuada para una actividad sexual satisfactoria. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en urología o médico de Atención Primaria</i>
G04BX03	ACIDO ACETOHIDROXAMICO	URONEFREX 125 MG 50 CAPSULAS URONEFREX 250 MG 50 CAPSULAS	Exclusivamente urolitiasis provocadas por infecciones urinarias por gérmenes productores de ureasa (Proteus, Klebsiella, Pseudomonas), especialmente cuando hayan fracasado otras terapéuticas. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en urología o nefrología.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por este especialista.</i>
G04CB01	FINASTERIDA CPD	FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDOS PROSCAR 5 MG 28 COMP	Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna sintomática en varones con aumento de tamaño de la próstata. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en urología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
G04CB02	DUTASTERIDA CPD	DUTASTERIDA 0,5 MG CAPSULAS BLANDAS AVIDART 0,5 MG 30 CAPSULAS BLANDAS	- Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de próstata (HBP). - Reducción del riesgo de retención aguda de orina y de cirugía en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en urología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
H01AX01	PEGVISOMANT DH	*SOMAVERT 10 MG/VIAL 30 VIALES POLVO Y DISOLVENTE PARA SOL INYECTABLE *SOMAVERT 15 MG/VIAL 30 VIALES POLVO Y DISOLVENTE PARA SOL INYECTABLE *SOMAVERT 20 MG/VIAL 30 VIALES POLVO Y DISOLVENTE PARA SOL INYECTABLE *SOMAVERT 25 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE 30 VIALES + 30 VIALES DE DISOLVENTE SOMAVERT 30 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE 30 VIALES + 30 VIALES DE DISOLVENTE	Tratamiento de pacientes con acromegalia que no hayan respondido de forma adecuada a tratamiento con cirugía y/o radiación o en los que un adecuado tratamiento médico con análogos de la somatostatina no haya normalizado las concentraciones de IGF-I o no haya sido tolerado. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
H01CA02	NAFARELINA CPD	*SYNAREL 200 MCG/PULV SOLUCION PULVERIZACION NASAL 8 ML	Endometriosis de localización genital y extragenital (del estadio I al estadio IV). Programas de estimulación ovárica controlada, previos a la fertilización in vitro, bajo la supervisión de un especialista. <i>Para la indicación del tratamiento de la infertilidad, informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
H01CB02	OCTREOTIDA DH	*OCTREOTIDA 0,05 MG/ML 5 AMPOLLAS 1 ML SOLUCION INYECTABLE *OCTREOTIDA 0,1 MG/ML 1 VIAL SOLUCION INYECTABLE *OCTREOTIDA 1 MG/5 ML (0,2 MG/ML) 5 AMPOLLAS 1 ML SOLUCION INYECTABLE *OCTREOTIDA 0,5 MG/ML 5 AMPOLLAS SOLUCION INYECTABLE *SANDOSTATIN 50 MCG/ML 5 AMP 1 ML *SANDOSTATIN 100 MG/ML 5 AMP 1 ML	▪ Acromegalia: – Para el control sintomático y reducción de los niveles plasmáticos de hormona del crecimiento y somatomedina-C en pacientes con acromegalia que responden inadecuadamente al tratamiento convencional. – Pacientes acromegálicos que presentan malas condiciones físicas o se muestran poco dispuestos a sufrir una intervención quirúrgica, o en el período intermedio hasta que la radioterapia resulte completamente efectiva. ▪ Tumores gastroenteropancreáticos: Para la mejoría de los síntomas asociados a tumores endocrinos gastroenteropancreáticos: – Tumores carcinoides. – VIPomas – Otros tumores gastroenteropancreáticos: glucagonomas, gastrinomas, insulinomas, GRFomas ▪ Prevención de las complicaciones surgidas tras la cirugía pancreática. ▪ Varices gastro-esofágicas sangrantes. – En el tratamiento de urgencia para detener la hemorragia y proteger de una hemorragia recurrente debido a varices gastro-esofágicas en pacientes afectos de cirrosis. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*SANDOSTATIN LAR 10 MG 1 VIAL *SANDOSTATIN LAR 20 MG 1 VIAL *SANDOSTATIN LAR 30 MG 1 VIAL	- Indicado en el tratamiento de la acromegalia en: - Pacientes en los que el tratamiento convencional es inadecuado o ineficaz, o durante el periodo que transcurre hasta que la radioterapia sea completamente eficaz. - Tratamiento de pacientes con síntomas asociados con tumores endocrinos gastroenteropancreáticos funcionales p.ej. tumores carcinoides con características del síndrome carcinoide. - Tratamiento de pacientes con tumores neoureendocrinos avanzados del intestino o tumor primario de origen desconocido donde se han excluido los lugares de origen no intestinal. - Tratamiento de adenomas de la pituitaria secretores de TSH: cuando la secreción no se ha normalizado después de la cirugía y/o la radioterapia; en pacientes para los que la cirugía no es adecuada; en pacientes irradiados, hasta que la radioterapia sea eficaz. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
H01CB03	LANREOTIDA ACETATO DH	*SOMATULINA AUTOGEL 60 MG, sol iny- 1 jer precarg *SOMATULINA AUTOGEL 90 MG, sol iny- 1 jer precarg *SOMATULINA AUTOGEL 120 MG, sol iny-1 jer precarg *MYRELEZ 120 MG SOLUCION INYECTABLE EFG, 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML	- Tratamiento de pacientes con acromegalia en los que el tratamiento convencional es inadecuado o ineficaz. - Tratamiento de los síntomas clínicos asociados a los tumores neuroendocrinos (tumores carcinoides, VIPomas, gastrinomas, glucagonomas, insulinomas).

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*MYRELEZ 60 MG SOLUCION INYECTABLE EFG, 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML *MYRELEZ 90 MG SOLUCION INYECTABLE EFG, 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML	Tratamiento de pacientes adultos con tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (TNEs-GEP) de grado 1 y un subgrupo de grado 2 (índice Ki67 hasta 10 %) de intestino medio, páncreas o de origen desconocido donde se han excluido los de origen de intestino posterior, y que presentan enfermedad localmente avanzada irresecable o metastásica. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
H01CB05	PASIREOTIDA DH	*SIGNIFOR 20 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA *SIGNIFOR 40 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA *SIGNIFOR 60 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA	Tratamiento de pacientes adultos con acromegalia en los que la cirugía no es una opción o no ha sido curativa y que no están adecuadamente controlados con el tratamiento con otro análogo de somatostatina (octeotrida y lanreotida). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
H01CC01	GANIRELIX DH	*ASTARTE 0,25 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE, 1 JERINGA PRECARGADA EFG *ASTARTE 0,25 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE, 5 JERINGAS PRECARGADA EFG *FYREMADEL 0,25 MG / 0,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA EFG , 1 JERINGA DE 0,5 ML * FYREMADEL 0,25 MG / 0,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA EFG , 5 JERINGAS DE 0,5 ML *ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML 1 JERINGA PRECARGADA SOLUCION INYECTABLE	Prevención de picos prematuros de hormona luteinizante (LH) en mujeres sometidas a hiperestimulación ovárica controlada (HOC) para técnicas de reproducción asistida (TRA). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML SOL INY 5 JERINGAS PRECARGADAS SOLUCION INYECTABLE * GANIRELIX GEDEON RICHTER 0,25 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE 1 JERINGA PRECARGA * GANIRELIX GEDEON RICHTER 0,25 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE 6 JERINGA PRECARGA	
H01CC02	CETRORELIX DH	*CETROTIDE 0,25 MG/VIAL 1 VIAL + 1 JER PREC *CETROTIDE 0,25 MG/VIAL 7 VIALES + 7 JER PREC *CEZIBOE 0,25MG 1 JERINGA PRECARGADA SOLUCION INYECTABLE	Prevenición de la ovulación prematura en pacientes sometidas a una estimulación ovárica controlada seguida por extracción de ovocitos y técnicas de reproducción asistida. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>
H01CC04	LINZAGOLIX DH	*YSELT 100 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Tratamiento de pacientes con fibromas uterinos y con síntomas moderados o graves que interfieran su calidad de vida, con importante sangrado menstrual asociado a dichos fibromas (mayor o igual a 80 mL por ciclo durante 2 ciclos o mayor o igual a 160 mL en un ciclo medido por el método de la hematina alcalina, si esta técnica estuviera disponible, o medido mediante escala debidamente validada). Tras un año de tratamiento, se deberá realizar valoración de la masa ósea mediante absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) o técnica similar disponible, para poder continuar con el tratamiento. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en ginecología.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*YSELTY 200 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Tratamiento de pacientes con fibromas uterinos y con síntomas moderados o graves que interfieran su calidad de vida, con importante sangrado menstrual asociado a dichos fibromas (mayor o igual a 80 mL por ciclo durante 2 ciclos o mayor o igual a 160 mL en un ciclo medido por el método de la hematina alcalina, si esta técnica estuviera disponible, o medido mediante escala debidamente validada). Tras un año de tratamiento, se deberá realizar valoración de la masa ósea mediante absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) o técnica similar disponible, para poder continuar con el tratamiento. - Tratamiento sintomático de endometriosis en mujeres adultas en edad reproductiva con antecedentes de tratamiento médico o quirúrgico previo, restringida a mujeres con endometriosis confirmada por visualización directa durante intervención quirúrgica, confirmación histológica y/o técnicas de diagnóstico por imagen, y que padezcan dolor de moderado a intenso evaluado según una escala de valoración numérica (NRS) de 11 puntos, que concretamente obtengan una puntuación en la escala NRS $\geq 4,0$ en al menos 2 días para dismenorrea y: - Tengan una puntuación media NRS (obtenida de la medición del dolor durante los 35 días previos) para dolor pélvico no menstrual (DPNM) $\geq 2,5$; o - Tengan una puntuación media NRS (obtenida de la medición del dolor durante los 35 días previos) para DPNM $\geq 1,25$ y NRS para DPNM $\geq 5,0$ en ≥ 4 días. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en ginecología.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
H01CC54	RELUGOLIX, ESTRADIOL Y NORESTISTERONA CPD	RYEQO 40 MG/1 MG/0,5 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Tratamiento de los síntomas moderados a graves de los miomas uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva. Con fibromas uterinos y con síntomas moderados o graves que interfieran su calidad de vida, con importante sangrado menstrual asociado a dichos fibromas y sin historial de problemas cardiovasculares o tromboembólicos o en las que no sea adecuada la cirugía radical (histerectomía) y que no deseen concebir durante el tratamiento. Tras un año de tratamiento, se deberá realizar valoración de la masa ósea mediante absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) o técnica similar disponible, para poder continuar con el tratamiento. - Tratamiento sintomático de endometriosis en mujeres adultas en edad reproductiva con antecedentes de tratamiento médico o quirúrgico previo, restringida a mujeres con endometriosis confirmada por visualización directa durante intervención quirúrgica, confirmación histológica y/o técnicas de diagnóstico por imagen, y que padezcan dolor de moderado a intenso evaluado según una escala de valoración numérica (NRS) de 11 puntos, que concretamente obtengan una puntuación en la escala NRS $\geq 4,0$ en al menos 2 días para dismenorrea y: - Tengan una puntuación media NRS (obtenida de la medición del dolor durante los 35 días previos) para dolor pélvico no menstrual (DPNM) $\geq 2,5$; o - Tengan una puntuación media NRS (obtenida de la medición del dolor durante los 35 días previos) para DPNM $\geq 1,25$ y NRS para DPNM $\geq 5,0$ en ≥ 4 días.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en ginecología.</i>
H02AB04	METILPREDNISOLONA DH	URBASON 40 MG 20 COMP	Todas las indicaciones propias de la corticoterapia por vía sistémica, excepto en estados que comporten riesgo vital, que precisan vía i.v. Está indicada principalmente en: enfermedades hemáticas, de órganos internos, cutáneas, inmunosupresión tras trasplantes y coadyuvante en tratamiento con citostáticos y en radioterapia; tratamiento sustitutorio en la enfermedad de Addison y tras adrenalectomía. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
H04AA01	GLUCAGON CPD	*BAQSIMI 3 MG POLVO NASAL 1 ENVASE UNIDOSIS	Pacientes entre los 4 años cumplidos hasta el cumplimiento de los 18 años en tratamiento con insulina y con alto riesgo de hipoglucemia grave con pérdida de consciencia. A efectos de la autorización del visado se tomarán en consideración los episodios previos de pérdida de consciencia por hipoglucemias. Se prescribirá un solo envase por paciente, siendo necesaria la valoración médica para prescribir el siguiente envase, con el fin de conocer la situación clínica del paciente en relación a las hipoglucemias graves con pérdida de consciencia. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología, medicina interna y pediatría hospitalaria.</i>
H05BA01	CALCITONINA	CALCITONINA ALMIRALL 100 UI SOLUCION INYECTABLE	Tratamiento de la enfermedad de Paget.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		CALCITONINA HUBBER 100 UI SOLUCION INYECTABLE	<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en endocrinología o medicina interna.</i>
H05BX02	PARICALCITOL DH	PARICALCITOL 1 MICROGRAMO 28 CAPSULAS BLANDAS PLEOPAR 1 MICROGRAMO 28 CAPSULAS BLANDAS ZEMPLAR 1MCG 28 CAPSULAS BLANDAS	Prevenición y tratamiento del hiperparatiroidismo secundario asociado con insuficiencia renal crónica (enfermedad renal crónica, estadios 3 y 4), y fallo renal crónico (enfermedad renal crónica estadio 5), en pacientes sometidos a hemodiálisis o diálisis peritoneal. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
J01DC01	CEFOXITINA DH	CEFOXITINA NORMON 1G 1 INY IV 10 ML EFG	- En el tratamiento de las siguientes infecciones graves causadas por gérmenes sensibles: - Infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo neumonía y abscesos pulmonares. - Infecciones del tracto génito-urinario, incluyendo cistitis agudas no complicadas, uretritis o cervicitis gonocócica no complicada. - En profilaxis quirúrgica, la administración perioperatoria de cefoxitina puede reducir la incidencia de infecciones postoperatorias en cirugía limpia (histerectomía vaginal y/o abdominal, cesárea) o en cirugía contaminada (colorrectal, apendicectomía). Sin embargo, cefoxitina no es el antibiótico de elección en la cirugía contaminada. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
J01DD01	CEFOTAXIMA DH	CEFOTAXIMA IM 1G/VIAL 1 INYEC 4 ML CEFOTAXIMA IV 1G/VIAL 1 INYEC 4 ML	- Tratamiento de las siguientes infecciones causadas por gérmenes sensibles: - Infecciones otorrinolaringológicas. - Infecciones de vía respiratoria inferior, incluyendo exacerbación de bronquitis crónica, neumonía bacteriana, bronquiectasias infectadas, y abscesos pulmonares. - Infecciones del tracto génito-urinario, incluyendo enfermedad gonocócica no complicada, celulitis pélvica, endometritis, prostatitis y anexitis. - Septicemia. - Endocarditis infecciosa. - Infecciones del Sistema Nervioso Central (meningitis, fundamentalmente aquellas causadas por gérmenes Gram-negativos). - Infecciones de piel y tejidos blandos, incluyendo quemaduras y heridas infectadas. - Infecciones osteoarticulares, tales como osteomielitis y artritis séptica. - Infecciones de la cavidad abdominal (peritonitis, infecciones del tracto biliar). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
J01DD02	CEFTAZIDIMA DH	CEFTAZIDIMA 1 G 1 VIAL + 1 AMP POLVO Y DISOLV SOL INY CEFTAZIDIMA 500 MG 1 VIAL + 1 AMP POLVO Y DISOLV SOL INY FORTAM 1 G INYECTABLE	- Infecciones severas por gérmenes sensibles cuando otras alternativas terapéuticas resulten ineficaces (aconsejable antibiograma). Tratamiento de las infecciones que se enumeran a continuación en adultos y niños, lo que incluye a neonatos (desde el nacimiento): - Neumonía nosocomial.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			– Infecciones broncopulmonares en la fibrosis quística. – Meningitis bacteriana. – Otitis media supurativa crónica. – Otitis externa maligna. – Infecciones complicadas del tracto urinario. – Infecciones complicadas de la piel y los tejidos blandos. – Infecciones intrabdominales complicadas. – Infecciones óseas y articulares. – Peritonitis asociada a la diálisis en pacientes con DPAC (diálisis peritoneal ambulatoria continua). – Tratamiento de pacientes que padezcan una bacteriemia que se produzca simultáneamente o de la que se tenga la sospecha de que está relacionada con alguna de las infecciones enumeradas anteriormente. ▪ Ceftazidima puede usarse en el tratamiento de pacientes neutropénicos que padezcan una fiebre de la que se tenga la sospecha de que se debe a una infección bacteriana. ▪ Ceftazidima puede usarse en la profilaxis perioperatoria de infecciones urinarias en pacientes sometidos a una resección transuretral de la próstata (RTUP). ▪ La selección de ceftazidima debe tener en cuenta su espectro antibacteriano, que está principalmente restringido a bacterias aerobias Gram negativas. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
J01DE01	CEFEPIMA DH	CEFEPIMA 1 G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 1 VIAL	▪ Adultos y adolescentes: Infecciones causadas por patógenos sensibles a cefepima: – Neumonía.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			– Infecciones graves del tracto urinario. – Infecciones de la piel y de los tejidos blandos. – Tratamiento empírico de pacientes con neutropenia febril: En pacientes con neutropenia febril está indicada la monoterapia con cefepima. – Infecciones intra-abdominales graves/complicadas, incluidas peritonitis e infección de la vesícula biliar. – Profilaxis en la cirugía intra-abdominal. ▪ Niños (de 2 meses a 12 años:) Para el tratamiento de las infecciones causadas por patógenos sensibles a cefepima: – Neumonía grave. – Infecciones graves del tracto urinario. – Infecciones de la piel y de los tejidos blandos. – Tratamiento empírico de los pacientes con neutropenia febril. – Meningitis bacteriana. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
J01FF01	CLINDAMICINA DH	CLINDAMICINA 300 MG/AMP 1 AMP 2 ML CLINDAMICINA 600 MG/AMP 1 AMP 4 ML	▪ En las siguientes infecciones graves causadas por gérmenes sensibles: – Infecciones graves del tracto respiratorio inferior, tales como empiema, neumonía y absceso pulmonar. – Infecciones de la piel y tejidos blandos. – Infecciones intra-abdominales, tales como peritonitis y abscesos intraabdominales. – Infecciones óseas y articulares, tales como osteomielitis y artritis séptica. – Septicemia.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			– Infecciones del tracto genital femenino, tales como endometritis, infecciones vaginales postquirúrgicas, abscesos tubo-ováricos no gonocócicos, celulitis pélvica, salpingitis y enfermedades inflamatoria pélvica aguda, siempre y cuando se administre simultáneamente un antibiótico de adecuado espectro frente a bacterias Gram-negativas aerobias. ▪ En combinación con otros fármacos antiprotozoarios en el tratamiento de las siguientes infecciones: – Encefalitis toxoplásmica en pacientes con SIDA. – Neumonía por <i>Pneumocystis carinii</i> en pacientes con SIDA. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
J01FF02	LINCOMICINA DH	LINCOCIN 600 MG 1 AMPOLLA 2 ML	▪ Actinomicosis, erisipela, infecciones abdominales, infecciones cutáneas y de tejidos blandos, genitourinaria, infecciones óseas, infecciones en quemaduras, otitis media supurada crónica, neumonía, septicemia, sinusitis. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
J01XA01	VANCOMICINA DH	VANCOMICINA 1 G/IV 1 VIAL INY VANCOMICINA 500 MG/IV 1 VIAL INY	▪ Administración intravenosa: En todos los grupos de edad para el tratamiento de las siguientes infecciones: – Infecciones complicadas de la piel y los tejidos blandos (IPPBc). – Infecciones en los huesos y las articulaciones. – Neumonía adquirida en la comunidad (NAC).

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			– Neumonía intrahospitalaria (NAH), incluyendo la neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV). – Endocarditis infecciosa. La vancomicina también está indicada en todos los grupos de edad para la profilaxis antibacteriana perioperatoria en pacientes con alto riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana cuando se someten a procedimientos quirúrgicos mayores. ▪ Administración oral: La vancomicina está indicada en todos los grupos de edad para el tratamiento de la infección por <i>Clostridioides difficile</i> (ICD). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
J01XX01	FOSFOMICINA SODICA DH	FOSFOCINA IV 1 G INYECTABLE	▪ Intravenosa está indicada en el tratamiento de infecciones complicadas o graves urinarias, dermatológicas, ginecológicas, respiratorias, del aparato locomotor, quirúrgicas, septicemias, endocarditis y meningitis producidas por microorganismos sensibles a la fosfomicina. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L01AA01	CICLOFOSFAMIDA DH	*GENOXAL 50 MG 20 COMPRIMIDOS	▪ Linfoma de Hodgkin, Linfomas no Hodgkin y Mieloma Múltiple. ▪ Leucemia linfocítica crónica (LLC) y Leucemia linfocítica aguda (LLA). ▪ Leucemia mieloide crónica y leucemia linfoblástica aguda ▪ Sarcoma de Ewing. ▪ Neuroblastoma avanzado o metastásico.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			▪ Carcinoma de mama y ovárico metastásico. ▪ Tratamiento adyuvante del carcinoma de mama. ▪ Carcinoma microcítico de pulmón. ▪ Como inmunosupresor en trasplantes de órganos y de médula ósea. ▪ En enfermedades autoinmunes como: granulomatosis de Wegener y formas progresivas graves del LES (nefritis lúpica). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L01CB01	ETOPOSIDO DH	*VEPESID 100 MG 10 CAPSULAS *VEPESID 50 MG 20 CAPSULAS	▪ Carcinoma de células pequeñas de pulmón. Leucemia aguda mielo-monocítica, leucemia aguda monocítica. Linfomas malignos (no de Hodgkin). Enfermedad de Hodgkin. Tumores testiculares y tumores testiculares refractarios. ▪ Cáncer ovárico: En combinación con otros fármacos quimioterapéuticos aprobados para el tratamiento del cáncer ovárico no epitelial en adultos. Tratamiento del cáncer ovárico epitelial resistente/refractario al platino en adultos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L01XX14	TRETINOINA DH	*VESANOID 10 MG 100 CAPSULAS BLANDAS	▪ Indicado en combinación con el trióxido de arsénico o quimioterapia para el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda (LPA) en pacientes de nuevo diagnóstico, recidivantes o refractarios a la quimioterapia. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
L01XX23	MITOTANO DH	*LYSODREN 500 MG 100 COMPRIMIDOS	Tratamiento sintomático del carcinoma de la corteza suprarrenal avanzado (inextirpable, metastático o de recaída). No se ha determinado su efecto en el carcinoma no funcional de la corteza suprarrenal. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L01XX35	ANAGRELIDA DH	* ANAGRELIDA 0,5 MG 100 CAPSULAS DURAS * XAGRID 0,5 MG 1 FRASCO 100 CAPSULAS DURAS	Reducción del recuento elevado de plaquetas en pacientes de riesgo con trombocitemia esencial que no toleran el tratamiento que están siguiendo o cuyo recuento de plaquetas no disminuye hasta un nivel aceptable con dicho tratamiento. Paciente de riesgo con trombocitemia esencial: se define por una o más de las siguientes características: > 60 años o recuento de plaquetas > 1000 x 10⁹/l o antecedentes de acontecimientos trombohemorrágicos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L02AE01	BUSERELINA CPD	*SUPREFACT 1 MG/ML 2 VIALES 5,5 ML	- En el hombre: Carcinoma de próstata, cuando esté indicado suprimir la producción de hormonas testiculares. - En la mujer: Tratamiento complementario, en asociación con gonadotropinas, para la inducción de la ovulación en un programa de fecundación in vitro. <i>Para la indicación del tratamiento de la infertilidad, informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>
		*SUPREFACT NASAL 0,1 MG/PULSACION 2 FRASCOS	▪ Carcinoma de próstata, cuando esté indicado suprimir la producción de hormonas testiculares. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L02AE03	GOSERELINA CPD	*ZOLADEX 3,6 MG/JER 1 IMPLANTE JERINGA PREC	▪ Carcinoma de próstata avanzado, cuando el tratamiento hormonal está indicado. ▪ Cáncer de mama en pacientes pre y perimenopáusicas, en las que el tratamiento hormonal es apropiado. ▪ Endometriosis. ▪ Fibromas uterinos. ▪ Disminución del grosor del endometrio antes de la ablación del mismo. Para esta indicación, se deberán administrar dos depots de ZOLADEX 3,6 con intervalo de cuatro semanas, estando planificada la intervención quirúrgica entre la semana cero y la segunda después del último depot inyectado. ▪ Reproducción asistida: Supresión del control hipofisario en la preparación para la superovulación. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L02AE04	TRIPTORELINA CPD	*DECAPEPTYL MENSUAL 3,75 MG POLVO Y DISOLV PARA SUSP 1 INY	▪ Cáncer de próstata hormono-dependiente, localmente avanzado o metastásico.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			▪ Cáncer de próstata hormono-dependiente, localizado de alto riesgo o localmente avanzado, en combinación con radioterapia. ▪ Endometriosis genital y extragenital. ▪ Fibromas uterinos. ▪ Infertilidad femenina. Tratamiento complementario asociado a gonadotropinas (HMG, FSH, HCG) durante la inducción de la ovulación para la fertilización in vitro y transferencia de embrión (F.I.V.T.E.). ▪ Pubertad precoz (en las niñas, el tratamiento debe iniciarse antes de los 8 años y, en los niños, antes de los 10 años). <i>Para la indicación del tratamiento de la infertilidad, informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado. Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i> <i>Para el resto de indicaciones, informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L02AE04	TRIPTORELINA DH	*DECAPEPTYL DIARIO 0,1 MG/VIAL - 7 VIALES 1 ML + 7 AMP DISOLVENTE	▪ Infertilidad femenina: Tratamiento complementario asociado a gonadotropinas (HMG, FSH, HCG) durante la inducción de la ovulación para la fertilización in vitro y transferencia de embrión (F.I.V.T.E) <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza autorizado según listado.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por especialista autorizado.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*GONAPEPTYL DEPOT 3,75 MG 1 JERINGA PRECARGADA POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSP INYECT	- En el hombre: tratamiento del carcinoma de próstata avanzado hormono-dependiente. - En la mujer: miomas uterinos sintomáticos, cuando está indicada la supresión de la hormonogénesis ovárica como medida pre-operatoria para reducir el tamaño de los miomas individuales previa a la programación de la enucleación del mioma o histerectomía; endometriosis sintomática confirmada por laparoscopia, cuando por su extensión está indicada la supresión de la hormonogénesis ovárica ya que el tratamiento quirúrgico no está indicado como primera medida. - En niños: tratamiento de la pubertad precoz central (PPC) (niñas menores de 9 años y niños menores de 10 años). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L03AB03	INTERFERON GAMMA-1b HUMANO RECOMBINANTE DH	*IMUKIN 100 MCG 1 VIAL INY	Tratamiento coadyuvante para reducir la frecuencia de infecciones graves en pacientes con granulomatosis crónica (GC). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
L04AX07	DIMETILFUMARATO DH	*SKILARENCE 120 MG 180 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES *SKILARENCE 120 MG 90 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES *SKILARENCE 30 MG 42 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES	Tratamiento de los pacientes adultos con psoriasis en placas de moderada a grave que no hayan respondido adecuadamente o sean intolerantes o tengan contraindicada o no esté recomendada la terapia sistémica convencional (metotrexato, ciclosporina y acitretina).

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
M04AB03	BENZBROMARONA DH	*URINORM 100 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Únicamente en pacientes que no respondan o no toleren el tratamiento con alopurinol en las siguientes situaciones: pacientes con gota severa (gota poliarticular o gota tofácea) en los que es imprescindible el control de la hiperuricemia; hiperuricemia en pacientes con insuficiencia renal con aclaración de creatinina superior a 20 ml/min; hiperuricemia en pacientes con trasplante renal. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en reumatología o nefrología.</i>
M05BX06	ROMOSUZUMAB DH	EVENITY 105 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA 2 PLUMAS PRECARGADAS	- La financiación se limita a mujeres con osteoporosis grave definidas como DMO $\leq -3,0$ y elevado riesgo de fractura previamente tratadas con bifosfonatos o con contraindicación a estos, que hayan experimentado una fractura previa por fragilidad (fractura osteoporótica mayor en los 24 meses previos), sin antecedentes de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial coronaria (incluidas revascularizaciones y hospitalización por angina inestable). Los pacientes deben tener un riesgo cardiovascular bajo o moderado, según REGICOR (un riesgo $< 10\%$ en las tablas de Framingham-REGICOR) o un riesgo bajo o moderado, $< 5\%$ en las tablas del SCORE. - Se establece criterio de parada de tratamiento en línea con la ficha técnica de 12 meses de duración de tratamiento. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
N01BB02	LIDOCAINA CPD	VERSATIS 700 MG APOSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO, 20 APOSITOS VERSATIS 700 MG APOSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO, 30 APOSITOS	Alivio sintomático del dolor neuropático asociado a infección previa por herpes zoster (neuralgia posherpética, NPH) en adultos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N02AA08	DIHIDROCODEINA (HIDROCODONA) FR	TOSIDRIN 10 MG/ML 15 ML SOLUCION GOTAS TOSIDRIN 10 MG/ML 30 ML SOLUCION GOTAS	Pacientes neoplásicos con tos persistente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N02AB03	FENTANILO CPD	*ABSTRAL 100 MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 100 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 200 MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 200 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 300 MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 300 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 400 MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 400 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 600 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ABSTRAL 800 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *ACTIQ 200 MCG, 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 200 MCG, 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 200 MCG, 30 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	Tratamiento de dolor irruptivo en pacientes que ya reciben tratamiento de mantenimiento con opiáceos para dolor crónico en cáncer. El dolor irruptivo es una exacerbación transitoria de dolor que se produce sobre una base de dolor persistente controlado por otros medios. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*ACTIQ 400 MCG, 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 400 MCG, 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 400 MCG, 30 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 600 MCG, 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 600 MCG, 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 600 MCG, 30 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 800 MCG, 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 800 MCG, 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 1200 MCG, 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 1200 MCG, 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *ACTIQ 1600 MCG, 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO *AVARIC 67 MCG 4 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET) *AVARIC 67 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET) *AVARIC 133 MCG 4 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET) *AVARIC 133 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET)	

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*AVARIC 267 MCG 4 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET) *AVARIC 267 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET) *AVARIC 400 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET) *AVARIC 533 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET) *AVARIC 800 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AL/PVC/AL-PET) *BREAKYL 200 MCG 28 PELICULAS BUCALES *BREAKYL 400 MCG 28 PELICULAS BUCALES *BREAKYL 600 MCG 28 PELICULAS BUCALES *BREAKYL 800 MCG 28 PELICULAS BUCALES *BREAKYL 1200 MCG 28 PELICULAS BUCALES *EFFENTORA 100MCG 4 COMPRIMIDOS BUCALES *EFFENTORA 100MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES *EFFENTORA 200MCG 4 COMPRIMIDOS BUCALES *EFFENTORA 200MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES *EFFENTORA 400MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES *EFFENTORA 600MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES *EFFENTORA 800MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES *FENTICERTA 100 MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *FENTICERTA 100 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *FENTICERTA 200 MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *FENTICERTA 200 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *FENTICERTA 300 MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *FENTICERTA 300 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *FENTICERTA 400 MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *FENTICERTA 400 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *FENTICERTA 600 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES	

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*FENTICERTA 800 MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *INSTANYL 50 MCG/DOSIS SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 ENVASE PULVERIZADOR DE 10 DOSIS *INSTANYL 50 MCG/DOSIS SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 ENVASE PULVERIZADOR DE 40 DOSIS *INSTANYL 100 MCG SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL EN ENVASE UNIDOSIS, 6 ENVASES PULVERIZADORES UNIDOSIS *INSTANYL 100 MCG/DOSIS SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 ENVASE PULVERIZADOR DE 10 DOSIS *INSTANYL 100 MCG/DOSIS SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 ENVASE PULVERIZADOR DE 40 DOSIS *INSTANYL 200 MCG/DOSIS SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 ENVASE PULVERIZADOR DE 10 DOSIS *INSTANYL 200 MCG/DOSIS SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 ENVASE PULVERIZADOR DE 40 DOSIS *KAPTIC 100 MCG 10 COMP SUBLINGUALES EFG *KAPTIC 100 MCG 30 COMP SUBLINGUALES EFG *KAPTIC 200 MCG 30 COMP SUBLINGUALES EFG *KAPTIC 300 MCG 30 COMP SUBLINGUALES EFG *KAPTIC 400 MCG 30 COMP SUBLINGUALES EFG *PECFENT 100 MCG/PULVERIZACION, SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 ENVASE PULVERIZADOR DE 8 DOSIS	

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*PECFENT 100 MCG/PULVERIZACION, SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 4 ENVASES PULVERIZADORES DE 8 DOSIS *PECFENT 400 MCG/PULVERIZACION, SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 ENVASE PULVERIZADOR DE 8 DOSIS *PECFENT 400 MCG/PULVERIZACION, SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 4 ENVASES PULVERIZADORES DE 8 DOSIS	
N02CC08	LASMIDITAN CPD	RAYVOW 50 MG 2 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA RAYVOW 50 MG 6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA RAYVOW 100 MG 2 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA RAYVOW 100 MG 6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	- Tratamiento agudo de la fase de cefalea de los ataques de migraña, con o sin aura en: - Pacientes adultos con al menos 3 crisis moderadas/severas de migraña al mes y que hayan utilizado al menos dos triptanes diferentes, durante periodos de tiempo y a dosis suficientes y se haya constatado la falta de respuesta. - Pacientes adultos con al menos 3 crisis moderadas/severas de migraña al mes en los que el tratamiento con triptanes se encuentre contraindicado por enfermedad cardiovascular. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
N02CD06	RIMEGEPANT CPD	VYDURA 75 MG LIOFILIZADO ORAL, 2 COMPRIMIDOS VYDURA 75 MG LIOFILIZADO ORAL, 8 COMPRIMIDOS	Tratamiento agudo de la migraña con o sin aura en adultos. Se restringe a pacientes adultos con al menos 2 crisis moderadas/severas de migraña al mes y que hayan utilizado al menos dos triptanes diferentes, durante periodos de tiempo y a dosis suficientes y se haya constatado la falta de respuesta.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe o médico de atención primaria.</i>
N03AF03	RUFINAMIDA DH	*INOVELON 100 MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA * INOVELON 200 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA * INOVELON 400 MG 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *INOVELON 40 MG/ML SUSPENSION ORAL 1 FRASCO DE 460 ML	Como terapia coadyuvante en el tratamiento de las crisis asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes de 1 año de edad o mayores. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
N04BA01	LEVODOPA CPD	*INBRIJA 33 MG 92 CAPSULAS DURAS +1 INHALADOR	- Tratamiento intermitente de las fluctuaciones motoras episódicas (períodos OFF) impredecibles en pacientes adultos con enfermedad de Parkinson (EP) tratados con levodopa/IDD en los que no se haya conseguido un adecuado control de las fluctuaciones motoras, tras la administración de otras alternativas terapéuticas como los inhibidores de la catecol-amino-metiltransferasa (ICOMT), inhibidores de la monoaminoxidasa B (IMAO-B) o los agonistas dopaminérgicos, en los que apomorfin - no sea una opción adecuada por su perfil de tolerabilidad y cuando los pacientes tengan una adecuada función respiratoria, sean capaces de realizar correctamente la técnica de administración y de reconocer el periodo OFF . <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en neurología.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
N04BC07	APOMORFINA DH	*APO-GO PEN 10 MG/ML 5 PLUMAS 3 ML *APO-GO PFS 5 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EN JERINGA *DACEPTON 5 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 1 VIAL *APO-GO POD 5 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EN CARTUCHO *APODEV 5 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 VIAL * DACEPTON 5MG/ML 5 VIALES 20ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG *KYNMOBI 10 MG + 15 MG + 20 MG + 25 MG + 30 MG PELICULAS SUBLINGUAL *KYNMOBI 25 MG 30 PELICULAS SUBLINGUAL	- Tratamiento de las fluctuaciones motoras incapacitantes que persisten en los pacientes con enfermedad de Parkinson, a pesar del tratamiento con levodopa ajustado individualmente (con o sin inhibidor periférico de la decarboxilasa) y/u otros agonistas dopaminérgicos. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i> - Tratamiento de las fluctuaciones motoras (fenómenos on-off) en pacientes con enfermedad de Parkinson que no estén suficientemente controlados mediante la medicación antiparkinsoniana oral. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i> - Tratamiento intermitente de los episodios OFF en pacientes adultos con enfermedad de Parkinson (EP), que no estén suficientemente controlados mediante la medicación antiparkinsoniana oral.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*KYNMOBI 20 MG 30 PELICULAS SUBLINGUAL *KYNMOBI 30 MG 30 PELICULAS SUBLINGUAL *KYNMOBI 15 MG 30 PELICULAS SUBLINGUAL *KYNMOBI 10 MG 30 PELICULAS SUBLINGUAL	<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
N04BX01	TOLCAPONA DH	*TASMAR 100 MG 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Indicado en combinación con levodopa/benseracida o levodopa/carbidopa en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática sensibles a levodopa y con fluctuaciones motoras, que no responden o son intolerantes a otros inhibidores de la COMT. Debido al riesgo de daño hepático agudo, potencialmente mortal, no debe considerarse de primera línea complementario a levodopa/benseracida levodopa/carbidopa. Si no se observan beneficios clínicos considerables dentro de las 3 semanas posteriores al inicio del tratamiento, se debe interrumpir. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
N05AE04	ZIPRASIDONA CPD-E	*ZELDOX 20 MG 56 CAPSULAS *ZELDOX 40 MG 14 CAPSULAS *ZELDOX 40 MG 56 CAPSULAS *ZELDOX 60 MG 56 CAPSULAS *ZELDOX 80 MG 56 CAPSULAS *ZIPRASIDONA 20 MG CAPSULAS DURAS *ZIPRASIDONA 40 MG CAPSULAS DURAS *ZIPRASIDONA 60 MG CAPSULAS DURAS *ZIPRASIDONA 80 MG CAPSULAS DURAS	- Tratamiento de la esquizofrenia. - Tratamiento de episodios maníacos o mixtos de gravedad moderada asociados con trastorno bipolar en adultos y en niños y adolescentes de 10-17 años. No se ha establecido la prevención de episodios en trastorno bipolar. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*ZELDOX 20 MG/VIAL 1 INYECTABLE 1,2 ML	Control rápido de la agitación en pacientes con esquizofrenia, cuando el tratamiento por vía oral no es apropiado, durante un máximo de 3 días consecutivos. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AE05	LURASIDONA CPD-E	*LATUDA 18,5 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *LATUDA 37 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *LATUDA 74 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *LURASIDONA 18,5 MG 28 COMPRIMIDOS *LURASIDONA 37 MG 28 COMPRIMIDOS *LURASIDONA 74 MG 28 COMPRIMIDOS	Tratamiento de la esquizofrenia en adultos y adolescentes de 13 años de edad y mayores. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AH03	OLANZAPINA CPD-E	*OLANZAPINA 2,5 MG COMPRIMIDOS *OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDOS *OLANZAPINA 7,5 MG COMPRIMIDOS *OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDOS *OLANZAPINA 2,5 MG COMP BUCODISPERSABLES *OLANZAPINA 5 MG COMP BUCODISPERSABLES *OLANZAPINA 7,5 MG COMP BUCODISPERSABLES *OLANZAPINA 10 MG COMP BUCODISPERSABLES *OLANZAPINA 15 MG COMP BUCODISPERSABLES *OLANZAPINA 20 MG COMP BUCODISPERSABLES *OLANZAPINA 2,5 MG CAPSULAS	- Tratamiento de la esquizofrenia. - Tratamiento del episodio maníaco moderado a severo. - Prevención de las recaídas en pacientes con trastorno bipolar cuyo episodio maníaco ha respondido al tratamiento con olanzapina. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*OLANZAPINA 5 MG CAPSULAS *OLANZAPINA 7,5 MG CAPSULAS *OLANZAPINA 10 MG CAPSULAS *OLANZAPINA 15 MG CAPSULAS *OLANZAPINA 20 MG CAPSULAS *ZYPREXA 10 MG 28 COMPRIMIDOS *ZYPREXA 10 MG 56 COMPRIMIDOS *ZYPREXA 2,5 MG 28 COMPRIMIDOS *ZYPREXA 5 MG 28 COMPRIMIDOS *ZYPREXA 7,5 MG 56 COMPRIMIDOS * ZYPREXA VELOTAB 5 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES *ZYPREXA VELOTAB 10 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES *ZYPREXA VELOTAB 10 MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES *ZYPREXA VELOTAB 15 MG 28COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES *ZYPREXA VELOTAB 20 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES	
		*OLANZAPINA 10 MG/VIAL 1 VIAL 2 ML INYEC *ZYPREXA 10 MG/VIAL 1 INYECTABLE 2 ML	Control rápido de la agitación y los comportamientos alterados en pacientes con esquizofrenia o episodio maniaco, cuando no es adecuado el tratamiento por vía oral. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AH04	QUETIAPINA	*QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Tratamiento de la esquizofrenia.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
	CPD-E	*QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *QUETIAPINA 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *QUETIAPINA 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *QUETIAPINA 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *QUETIAPINA 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA *QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA *QUETIAPINA 150 MG COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA *QUETIAPINA 200 MG COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA *QUETIAPINA 300 MG COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA *QUETIAPINA 400 MG COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA *QUETIAPINA 600 MG COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICADA *KETYLIX 25 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL	- Tratamiento del episodio maníaco moderado a grave. No se ha demostrado que evite las recurrencias de los episodios maníacos depresivos. - Tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolar. - Tratamiento de la prevención de la recurrencia del trastorno bipolar. - Tratamiento adicional de los episodios depresivos mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor (TDM) que no han tenido una respuesta óptima al tratamiento con antidepresivos en monoterapia. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AH05	ASENAPINA MALEATO CPD-E	*SYCREST 5 MG 60 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES *SYCREST 10 MG 60 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES	Tratamiento de los episodios maníacos de moderados a graves, asociados con el trastorno bipolar I en adultos. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AL05	AMISULPRIDA	*SOLIAN 100 MG 60 COMPRIMIDOS	Tratamiento de la esquizofrenia.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
	CPD-E	*SOLIAN 100 MG/ML SOLUCION ORAL 60 ML *SOLIAN 200 MG 60 COMPRIMIDOS *SOLIAN 400 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	<i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AX08	RISPERIDONA CPD-E	*RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUCION ORAL ML *RISPERIDONA 0,5 MG COMPRIMIDOS *RISPERIDONA 0,5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERS *RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDOS *RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERS *RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDOS *RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERS *RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDOS *RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERS *RISPERIDONA 4 MG COMPRIMIDOS *RISPERIDONA 4 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERS *RISPERIDONA 6 MG COMPRIMIDOS *RISPERDAL 1 MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RISPERDAL 1 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RISPERDAL 1 MG/1 ML 100 ML SOLUCIÓN ORAL *RISPERDAL 1 MG/1 ML 30 ML SOLUCIÓN ORAL **RISPERDAL 3 MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RISPERDAL 3 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RISPERDAL 6 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RISPERDAL 6 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	- Tratamiento de las psicosis esquizofrénicas agudas y crónicas, así como en otras condiciones psicóticas en las cuales los síntomas positivos (tales como alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, hostilidad, recelo) y/o síntomas negativos (tales como afectividad embotada, aislamiento social y emocional, pobreza de lenguaje) sean notables. También alivia los síntomas afectivos (tales como depresión, sentimientos de culpabilidad, ansiedad) asociados a la esquizofrenia. - Pacientes diagnosticados de demencia para el tratamiento sintomático de los cuadros psicóticos y episodios de agresividad severos que no respondan a medidas no farmacológicas y para los que se hayan descartado otras etiologías. - Medicación concomitante de los estabilizadores del estado del ánimo en el tratamiento de episodios maníacos asociados a trastornos bipolares. - Tratamiento de los problemas del comportamiento (tales como agresividad, hiperactividad y comportamiento estereotipado) asociados al autismo. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*OKEDI 100 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA, 1 JERINGA PRECARGADA + 1 JERINGA PRECARGADA + 2 AGUJAS *OKEDI 75 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA, 1 JERINGA PRECARGADA + 1 JERINGA PRECARGADA + 2 AGUJAS *RISPERDAL CONSTA 25 MG/VIAL 1 VIAL + 1 JER PRECARGADA *RISPERDAL CONSTA 37,5 MG/VIAL 1 VIAL + 1 JER PRECARGADA *RISPERDAL CONSTA 50 MG/VIAL 1 VIAL + 1 JER PRECARGADA	Tratamiento de la esquizofrenia en adultos en los que se ha establecido la tolerabilidad y efectividad con risperidona oral. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AX12	ARIPIPAZOL CPD-E	*ARIPIPAZOL 5 MG 28 COMPRIMIDOS *ARIPIPAZOL 10 MG 28 COMPRIMIDOS *ARIPIPAZOL 15 MG 28 COMPRIMIDOS *ARIPIPAZOL 10 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISP *ARIPIPAZOL 15 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISP *ARIPIPAZOL 20 MG 28 COMPRIMIDOS *ARIPIPAZOL 30 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISP *ARIPIPAZOL 30 MG 28 COMPRIMIDOS *ARIPIPAZOL 1 MG/ML SOLUCION ORAL 150 ML *ABILIFY 1 MG/ML 150 ML SOLUCION ORAL *ABILIFY 10 MG 28 COMPRIMIDOS *ABILIFY 10 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES *ABILIFY 15 MG 28 COMPRIMIDOS *ABILIFY 30 MG 28 COMPRIMIDOS *ABILIFY 15 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES *ABILIFY 5 MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES *ABIPOL 5 MG 28 CAPSULAS DURAS EFG *ABIPOL 10 MG 28 CAPSULAS DURAS EFG	- Tratamiento de episodios maníacos moderados o severos en Trastorno bipolar I y en la prevención de nuevos episodios maníacos en pacientes que presentaron episodios predominantemente maníacos y que respondieron al tratamiento con aripiprazol. - Tratamiento de la esquizofrenia en adultos o adolescentes de 15 años o más. - Tratamiento hasta 12 semanas de los episodios maníacos moderados o severos del Trastorno Bipolar I en adolescentes de 13 años o más. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*ABIPOL 15 MG 28 CAPSULAS DURAS EFG *ABILIFY 7,5 MG/ML 1 VIAL 1,3 ML SOL INYECTABLE	<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica</i>
		*ABILIFY MAINTENA 300 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION DE LIBERACION PROLONGADA 1 VIAL + 1 VIAL DE DISOLVENTE *ABILIFY MAINTENA 400 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION DE LIBERACION PROLONGADA 1 VIAL + 1 VIAL DE DISOLVENTE *ABILIFY MAINTENA 960 MG SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN JERINGA PRECARGADA *ABILIFY MAINTENA 720 MG SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN JERINGA PRECARGADA	Tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos estabilizados con aripiprazol oral. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AX13	PALIPERIDONA CPD-E	*PALIPERIDONA 3 MG 28 COMP LIBERACION MODIFI *PALIPERIDONA 6 MG 28 COMP LIBERACION MODIFI *PALIPERIDONA 9 MG 28 COMP LIBERACION MODIFI	- Tratamiento de la esquizofrenia en adultos y en adolescentes de 15 años de edad en adelante. - Tratamiento de del trastorno esquizoafectivo en adultos. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
N05AX13	PALIPERIDONA CPD-E	*PALIPERIDONA 150 MG SUSP INYECTABLE DE LIBER *PALIPERIDONA 100 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP INY LIB	Tratamiento de mantenimiento de la esquizofrenia en pacientes adultos estabilizados con paliperidona o risperidona. En determinados pacientes adultos con

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*PALIPERIDONA 75 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP INY LIB *PALIPERIDONA 50 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP INY LIB *PALIPERIDONA 350 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP INY LIB *PALIPERIDONA 263 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP INY LIB *PALIPERIDONA 525 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP INY LIB *PALIPERIDONA 175 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP INY LIB *PALIPERIDONA 700 MG INYECT 3,5 ML 1 JER PREC *PALIPERIDONA 1.000 MG INYECT 5 ML 1 JER PREC *INVEGA 3 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA *INVEGA 6 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA *INVEGA 9 MG 28 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA *BACEQ 75 MG SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA EFG, 1 JERINGA PRECARGADA + 2 AGUJAS *BACEQ 100 MG SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION P *BACEQ 150 MG SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA EFG, 1 JERINGA PRECARGADA + 2 AGUJAS *NIAPELF 25MG 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,75ML SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA EFG *NIAPELF 75MG 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,75ML SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA EFG	esquizofrenia y respuesta previa a paliperidona o risperidona oral, paliperidona puede ser utilizado sin necesidad de estabilización previa con tratamiento oral si los síntomas psicóticos son leves o moderados y es necesario un tratamiento inyectable de acción prolongada. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		*NIAPELF 100MG 1 JERINGA PRECARGADA DE 1ML SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA EFG *NIAPELF 150MG 1 JERINGA PRECARGADA DE 1,5ML SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA EFG *NIAPELF 50MG 1 JERINGA PRECARGADA DE 0,5ML SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA EFG *XEPLION 50 MG 1 JER PREC+2AGU SUSP INY LIB PROL *XEPLION 75 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP INY LIB PROL *XEPLION 100 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP IN LIB PROL *XEPLION 150 MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSP IN LIB PROL	
N05AX15	CARIPRAZINA CPD-E	*REAGILA 1,5 MG 7 CAPSULAS DURAS *REAGILA 1,5 MG 28 CAPSULAS DURAS *REAGILA 3 MG 7 CAPSULAS DURAS *REAGILA 3 MG 28 CAPSULAS DURAS *REAGILA 4,5 MG 28 CAPSULAS DURAS *REAGILA 6 MG 28 CAPSULAS DURAS	Tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, medicina interna, médico de atención primaria o geriátrica.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
N05AX16	BREXPIPAZOL CPD-E	*RXULTI 0,5 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RXULTI 1 MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RXULTI 1 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RXULTI 2 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RXULTI 3 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS *RXULTI 4 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Para el tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos. <i>Visado de inspección en caso de prescripción a pacientes mayores de 75 años.</i> <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría, neurología, médico de atención primaria.</i>
N05BA09	CLOBAZAM CPD	SILOCALM 1MG/ML 1 FRASCO DE 150ML SUSPENSION ORAL SILOCALM 2MG/ML 1 FRASCO DE 150ML SUSPENSION ORAL	Para el tratamiento coadyuvante de la epilepsia, que no se controla completamente por el tratamiento convencional con uno o más anticonvulsivantes en niños de 2 a 5 años de edad.
N06BA02	DEXANFETAMINA DH	TENTIN 5 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos TENTIN 10 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos TENTIN 20 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos	Tratamiento integral del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes de 6 a 17 años cuando la respuesta al tratamiento previo con metilfenidato se considera clínicamente inadecuada. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría o neurología o neuropsiquiatría.</i> <i>Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por el psiquiatra, neurólogo o neuropsiquiatra.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
N06BA12	LISDEXANFETAMINA DH	ELVANSE 30 MG 30 CAPSULAS DURAS ELVANSE 50 MG 30 CAPSULAS DURAS ELVANSE 70 MG 30 CAPSULAS DURAS	- Trastorno por Déficit de Atención - Hiperactividad (TDAH) en niños de 6 a 18 años, cuando la respuesta al tratamiento previo con metilfenidato se considere clínicamente inadecuada. El tratamiento debe estar bajo la supervisión de un especialista en trastornos del comportamiento en niños y/o adolescentes. El diagnóstico debe realizarse según los criterios de DSM-IV o las directrices incluidas en CIE-10. - Indicado como parte de un programa de tratamiento integral para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en adultos con síntomas previos de TDAH en la infancia. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría o neurología o neuropsiquiatría. Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por el psiquiatra, neurólogo o neuropsiquiatra.</i>
		ELVANSE ADULTOS 30 MG 30 CAPSULAS DURAS ELVANSE ADULTOS 50 MG 30 CAPSULAS DURAS ELVANSE ADULTOS 70 MG 30 CAPSULAS DURAS	Tratamiento integral para el TDAH en adultos solo en aquellos casos en los que la respuesta al tratamiento previo con metilfenidato se considere clínicamente inadecuada. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría o neurología. Todas las recetas y prescripciones deben ser realizadas por el psiquiatra o neurólogo.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
N06DA02	DONEPEZILO DH	DONEPEZILO 5 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DONPEZILO 5 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DONPEZILO 10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTO DONPEZILO 10 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTO DONPEZILO 2 MG/ML SOLUCION ORAL 150 ML DONPEZILO 5 MG 28 COMP BUCODISPERSABLES DONPEZILO 5 MG 56 COMP BUCODISPERSABLES DONPEZILO 10 MG 28 COMP BUCODISPERSABLES ARICEPT 10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ARICEPT 5 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ARICEPT FLAS 10 MG 28 COMP BUCODISPERSABLES ARICEPT FLAS 5 MG 28 COMP BUCODISPERSABLES COMPRIMIDOS LIXBEN 5 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA LIXBEN 5 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA LIXBEN 10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA LIXBEN 10 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA YASNAL 10 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Tratamiento sintomático de la demencia de Alzheimer de intensidad leve a moderadamente grave. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en psiquiatría o neurología.</i>
N06DA03	RIVASTIGMINA DH	RIVASTIGMINA 1,5 MG CAPSULAS RIVASTIGMINA 2 MG/ML SOLUCION ORAL 120 ML RIVASTIGMINA 3 MG CAPSULAS RIVASTIGMINA 4,5 MG 112 CAPSULAS RIVASTIGMINA 6 MG CAPSULAS EXELON 1,5 MG 112 CAPSULAS DURAS	- Tratamiento sintomático de la demencia de Alzheimer de intensidad leve a moderadamente grave. - Tratamiento sintomático de la demencia leve a moderadamente grave en pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		EXELON 1,5 MG 28 CAPSULAS DURAS EXELON 1,5 MG 56 CAPSULAS DURAS EXELON 2 MG/ML 120 ML SOLUCION ORAL EXELON 3 MG 112 CAPSULAS DURAS EXELON 3 MG 56 CAPSULAS DURAS EXELON 4,5 MG 112 CAPSULAS DURAS EXELON 4,5 MG 56 CAPSULAS DURAS EXELON 6 MG 112 CAPSULAS DURAS EXELON 6 MG 56 CAPSULAS DURAS PROMETAX 2 MG/ ML 120 ML SOLUCION ORAL PROMETAX 3 MG 112 CAPSULAS DURAS PROMETAX 3 MG 56 CAPSULAS DURAS PROMETAX 4,5 MG 112 CAPSULAS DURAS PROMETAX 4,5 MG 56 CAPSULAS DURAS	<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en neurología o psiquiatría.</i>
		RIVASTIGMINA 4,6 MG/24H PARCHES TRANSER RIVASTIGMINA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24H PARCHES RIVASTIGMINA DOS POR SEMANA 9,5 MG/24H PARCHES RIVASTIGMINA 9,5 MG/24H PARCHES TRANSER RIVASTIGMINA 13,3 MG/24H 60 PARCHES TRANSER ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H 8 PARCHES TRANSDERMICOS ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H 16 PARCHES TRANSDERMICOS ALZERTA DOS POR SEMANA 9,5 MG/24 H 16 PARCHES TRANSDERMICOS EXELON 4,6 MG/24H 30 SOBRES PARCHES TRANSDERMICOS EXELON 4,6 MG/24H 60 SOBRES PARCHES TRANSDERMICOS	Tratamiento sintomático de la demencia de Alzheimer de intensidad leve a moderadamente grave. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en neurología o psiquiatría.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		EXELON 9,5 MG/24H 60 SOBRES PARCHES TRANSDERMICOS EXELON 13,3 MG/24 H PARCHE TRANSDERMICO 60 (2 X 30) PARCHES PROMETAX 4,6 MG/24H 30 PARCHES TRANSDERMICOS PROMETAX 4,6 MG/24H 60 PARCHES TRANSDERMICOS PROMETAX 9,5 MG/24H 60 SOBRES PARCHES TRANSDERMICOS	
N06DA04	GALANTAMINA DH	GALANTAMINA 16 MG 28 CAPSULAS LIBERACION GALANTAMINA 24 MG 28 CAPSULAS LIBERACION GALANTAMINA 8 MG 28 CAPSULAS LIBERACION GALANTAMINA 4 MG/ML SOLUCION ORAL 100 ML REMINYL 8 MG 28 CAPSULAS LIB PROLONGADA REMINYL 16 MG 28 CAPSULAS LIB PROLONGADA REMINYL 24 MG 28 CAPSULAS LIB PROLONGADA	Tratamiento sintomático de la demencia tipo Alzheimer leve o moderadamente grave. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en neurología o psiquiatría.</i>
N06DA52	DONEPEZILO + MEMANTINA DH	DOMEX 10 MG/10 MG 28 COMPRIMIDOS REC DOMEX 10 MG/20 MG 28 COMPRIMIDOS REC DEZIPAR 10 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PE DEZIPAR 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PE	Para la terapia de sustitución en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer de moderada a grave adecuadamente controlada con donepezilo y memantina administrados simultáneamente a las mismas dosis que en la combinación a dosis fijas, pero como medicamentos separados. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en neurología o psiquiatría.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
N06DX01	MEMANTINA DH	MEMANTINA 5 MG/PULSACION (0,5 ML) SOLUCION ORAL 100 ML MEMANTINA 10 MG 112 COMPRIMIDOS MEMANTINA 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS MEMANTINA (5/10/15/20 MG) 7X5 + 7X10 + 7X15 + 7X20 COMPRIMIDOS MEMANTINA 10 MG/ML SUSP ORAL 100 ML MEMANTINA 20 MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISP MEMANTINA 10 MG 112 COMPRIMIDOS BUCODISP AXURA 10 MG 112 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA AXURA 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA AXURA 5 MG/PULSACION SOLUCION ORAL 100 ML AXURA 5/10/15/20MG 7X5 + 7X10 + 7X15 + 7X20 COMPRIMIDOS AXURA 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA DETAM 10 MG 112 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG DETAM 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG EBIXA 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EBIXA 10 MG 112 COMPS CUB. PELICULAR EBIXA 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EBIXA 5 MG/PULSACION SOLUCION ORAL 100 ML EBIXA 5/10/15/20MG 7X5 + 7X10 + 7X15 + 7X20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Tratamiento de pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderada a grave. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en neurología o psiquiatría.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
		MEMOREL FLAS 20 MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG MEMANTINA MACLEODS 5 MG/PULSACION SOLUCION ORAL EFG 1 FRASCO DE 100 ML NABILA 10 MG 112 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA NABILA 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA PROTALON 10 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA PROTALON 10 MG 112 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA PROTALON 20 MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG	
N07BB05	NALMEFENO CPD	*SELINCRO 18 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	Para la reducción del consumo de alcohol en pacientes adultos con dependencia del alcohol que presentan un nivel de consumo de alcohol de alto riesgo (NCR), sin síntomas de abstinencia físicos y que no requieran una desintoxicación inmediata. El tratamiento se debe iniciar únicamente en los pacientes que mantienen un NCR alto dos semanas después de la evaluación inicial. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
P01CB01	MEGLUMINA ANTIMONIATO DH	GLUCANTIME 1500 MG/5 ML SOLUCION INYECTABLE, 10 AMPOLLAS	Tratamiento de leishmaniasis visceral (Kala azar) leishmaniasis cutánea (Botón de Oriente) y mucocutánea.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
R05DA04	CODEINA FR	BISOLTUS 10 MG/5 ML 250 ML SOLUCION CODEISAN 28,7 MG 10 COMPRIMIDOS CODEISAN 28,7 MG 20 COMPRIMIDOS FLUDAN CODEINA 10 MG/5 ML 200 ML SOLUCION ORAL HISTAVERIN 10MG/5ML JARABE FRASCO CON 250ML NOTUSIN 250 ML SOLUCION ORAL TOSEINA 2MG/ML 250ML SOLUCION ORAL	Pacientes neoplásicos con tos persistente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
R05DA07	NOSCAPINA FR	TUSCALMAN 15 MG 20 SUPOSITARIOS NIÑOS TUSCALMAN 15 MG/5 ML 150 ML JARABE	Pacientes neoplásicos con tos persistente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
R05DA09	DEXTROMETORFANO FR	PROPALCOF 15MG/ML 1 FRASCO DE 20 ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	Pacientes neoplásicos con tos persistente. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
S01AD09	GANCICLOVIR DH	VIRGAN 1,5 MG/G GEL OFTALMICO 1 TUBO DE 5 G	Tratamiento de la queratitis superficial aguda causada por el virus Herpes simplex.

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
S01XA20	LAGRIMAS ARTIFICIALES FR	ACUOLENS SOLUCION, 30 ENVASES UNIDOSIS DE 0,5 ML CARMELOSA 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION 30 ENVASES UNIDOSIS DE 0,4 ML HIDRATHEA 9MG/ML 1 FRASCO DE 10ML COLIRIO EN SOLUCION HIPROMELOSA STADA 3,2 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION OCULOTECT 50 MG/ML 10 ML COLIRIO EN SOLUCION OCULOTECT 50 MG/ML 20 X 0,4 ML COLIRIO SOLUCION OFARSIN 2 MG/G MULTIDOSIS GEL OFTALMICO, 1 FRASCO 10G OFARSIN 2 MG/G GEL OFTALMICO 30 ENVASES UNIDOSIS 0,6 G SICCAFLUID 0,25 % 10G GEL OFTALMICO SICCAFLUID 2,5 MG/G GEL OFTALMICO EN UNIDOSIS, 30 MONODOSIS DE 0,5G SICCAFLUID 2,5 MG/G GEL OFTALMICO EN UNIDOSIS, 60 MONODOSIS DE 0,5G VISCOFRESH 0,5 % 10 UNIDOSIS 0,4 ML COLIRIO VISCOFRESH 0,5 % 30 UNIDOSIS 0,4 ML COLIRIO VISCOFRESH 1 % 10 UNIDOSIS 0,4 ML COLIRIO VISCOFRESH 1 % 30 UNIDOSIS 0,4 ML COLIRIO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
V01AA02	EXTRACTO POLEN PHLEUM PRATENSE CPD	GRAZAX 75000 SQ-T 30 LIOFILIZADOS ORALES GRAZAX 75000 SQ-T 90 LIOFILIZADO ORAL	Tratamiento de la rinitis y conjuntivitis inducida por polen de gramíneas en pacientes adultos y niños (de 5 años o mayores) con síntomas clínicamente relevantes y diagnosticados mediante prueba cutánea de prick positiva y/o test de IgE específica a polen de gramíneas.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
			<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en alergología, neumología u otorrinolaringología.</i>
V01AA02	EXTRACTO POLEN DACTYLIS GLOMERATA, ANTHOXANTHUM ODORATUM, LOLIUM PERENNE, POA PRATENSIS, PHLEUM PRATENSE CPD	ORALAIR 300 IR 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES ORALAIR INICIO 100/300 IR 1 X 3 + 1 X 28 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES	Tratamiento de la rinitis alérgica con o sin conjuntivitis inducida por polen de gramíneas en pacientes adultos, adolescentes y niños (mayores de 5 años) con síntomas clínicamente relevantes y diagnosticados mediante prueba cutánea de prick positiva y/o test de IgE específica a polen de gramíneas. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
V01AA03	EXTRACTO ALERGENICO DE POLVO DE ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS/FARINAE CPD	ACARIZAX 90 LIOFILIZADOS ORALES ACARIZAX 30 LIOFILIZADOS ORALES	Pacientes adultos (18-65 años), diagnosticados por su historia clínica y prueba positiva de sensibilización a ácaros del polvo doméstico (prueba cutánea de prick y/o IgE específica), que presenten asma alérgica por ácaros del polvo doméstico, parcialmente controlada con corticoesteroides inhalados y asociada a rinitis alérgica por ácaros del polvo doméstico, de leve a severa. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en alergología o neumología.</i>
		ACTAIR 100 IR & 300 IR 31 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (3 DE 100 IR + 28 DE 150 IR) ACTAIR 300 IR 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES ACTAIR 300 IR 90 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES	Rinitis moderada o grave inducida por ácaros del polvo doméstico (prueba de punción cutánea o prueba de IgE específica) en adolescentes (de 12 a 17 años) y en adultos. Duración del tratamiento limitada a 3 años. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en alergología o neumología.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
V03AC03	DEFERASIROX DH	*DEFERASIROX 90 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *DEFERASIROX 360 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *EXJADE 90 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *EXJADE 360 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA *FERUPANTIL 90 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG *FERUPANTIL 360 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG	- Tratamiento de la sobrecarga férrica crónica debida a transfusiones sanguíneas frecuentes ($>$ o igual 7ml/kg/mes de concentrado de hematíes) en pacientes con beta talasemia mayor, de edad igual o superior a 6 años. - Tratamiento de la sobrecarga férrica crónica debida a transfusiones sanguíneas cuando el tratamiento con deferoxamina este contraindicado o no sea adecuado en los siguientes grupos de pacientes: ✓ En pacientes pediátricos con beta talasemia mayor con sobrecarga férrica debida a transfusiones sanguíneas frecuentes (mayor o igual 7 ml/kg/mes de concentrado de hematíes) de 2 a 5 años, ✓ En adultos y pacientes pediátricos con beta talasemia mayor con sobrecarga férrica debida a transfusiones sanguíneas poco frecuentes (<7 ml/kg/mes de concentrado de hematíes) de edad igual o superior a 2 años, ✓ En adultos y pacientes pediátricos con otras anemias de edad igual o superior a 2 años. - Tratamiento de la sobrecarga férrica crónica que requiere tratamiento quelante cuando el tratamiento con deferoxamina está contraindicado o no es adecuado en pacientes con síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones de edad igual o superior a 10 años. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
V03AE09	PATIROMERO CALCICO CPD	* VELTASSA 8,4 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 SOBRES * VELTASSA 16,8 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 SOBRES	Tratamiento de la hiperpotasemia en adultos con ERC avanzada e insuficiencia cardíaca grado III-IV y con hiperpotasemia leve a moderada (5,5-6,4 mmol/litro), en tratamiento con inhibidores del SRAA y en los que se considere imprescindible su continuación, y con fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en nefrología, cardiología y medicina interna.</i>
V03AE10	CICLOSILICATO DE SODIO Y ZIRCONIO CPD	*LOKELMA 5 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 SOBRES *LOKELMA 10 G POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 SOBRES	Tratamiento de la hiperpotasemia en pacientes adultos con ERC avanzada e insuficiencia cardíaca grado III-IV y con hiperpotasemia leve a moderada (5,5-6,4 mmol/litro), en tratamiento con inhibidores del SRAA y en los que se considere imprescindible su continuación, y con fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en nefrología, cardiología y medicina interna.</i>
V04CD05	SOMATORELINA DH	*GHRH FERRING 1 AMPOLLA DE PRINCIPIO ACTIVO + 1 AMPOLLAS DISOLVENTE	Determinar la función somatotrópica de la hipófisis anterior en casos de sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento, pero no debe utilizarse de forma rutinaria como análisis diagnóstico de los déficits de hormona de crecimiento. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
V04CX	COLINA HIDROCLORURO	PROVOCHOLINE 100 MG 6 VIALES 20 ML POLVO PARA INHALACION	Diagnóstico de la hiperreactividad de las vías aéreas bronquiales en pacientes sin asma clínicamente aparente.

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
	DH		<i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
V04CX	TEST DE UREA CPD	TAU KIT 100 MG 1 COMP SOLUBLES UBTEST 100MG 1 COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA	Diagnóstico "in vivo" de la infección gastroduodenal por <i>Helicobacter pylori</i>. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en digestivo, pediatra, médico de atención primaria o geriátrica.</i>
V04CX	HEXAMINOLEVULINICO DH	HEXVIX 85 MG 1 VIAL 10 ML POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INTRAVESICAL	Únicamente para uso diagnóstico. Detección del cáncer de vejiga (p. ej., del carcinoma in situ) en pacientes con cáncer de vejiga conocido o alta sospecha del mismo conforme a los resultados de, p. ej., una cistoscopia de cribado o de una citología urinaria positiva. La cistoscopia de fluorescencia con luz azul se debería utilizar como método adyuvante a la cistoscopia estándar con luz blanca para servir de guía en los procedimientos de toma de biopsias. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe.</i>
22A01	CAMARAS DE INHALACION PEDIATRICAS FR	BABYHALER AEROCHAMBER PLUS PEDIATRICO AEROCHAMBER PLUS NEONATAL DIAMOND CON MASCARILLA NEONATO DIAMOND CON MASCARILLA INFANTIL	- Asma infantil para niños de 0 a 4 años (no financiados en niños con 4 años cumplidos). - Bronquiolitis para niños de 0 a 2 años (no financiados en niños con 2 años cumplidos). <i>Prescripción de una sola cámara por niño. Por especialista en pediatría, neumología, urgencias o alergología infantil.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
23A01	BOLSAS RECOGIDA ORINA PIERNA	CONVEEN MULTICANAL 600ML TUBO 45CM 10U CONVEEN MULTICANAL 800ML TUBO 45CM 10U CONVEEN MULTICANAL 800ML TUBO 65CM 10U	Incontinencia y retención urinaria, y su utilización se circunscribe a lesionados medulares y grandes discapacitados físicos, pacientes con espina bífida, con esclerosis múltiple y con esclerosis lateral amiotrófica, así como a aquellos otros pacientes que por la gravedad de su patología precisen su utilización. <i>Un envase de 10 unidades para el periodo de un mes.</i>
23B05	COLECTOR BOLSA RECOG ORINA FEMENINO	VILUC 1 U + 14 ADHESIVOS	
23C	ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA	ABSORB INCONTINENCIA DIA ANATOMICO ABSORB INCONTINENCIA DIA ELASTICO ABSORB INCONTINENCIA DIA RECTANGULAR ABSORB INCONTINENCIA PANTS DIA ABSORB INCONTINENCIA NOCHE ANATOMICO ABSORB INCONTINENCIA NOCHE ELASTICO ABSORB INCONTINENCIA NOCHE RECTANGULAR ABSORB INCONTINENCIA PANTS NOCHE ABSORB INCONTINENCIA SUPER NOCHE ANATOMICO ABSORB INCONTINENCIA SUPER NOCHE ELASTICO ABSORB INCONTINENCIA SUPER NOCHE RECTANGULAR ABSORB INCONTINENCIA PANTS SUPERNOCHE	Incontinencia urinaria y/o fecal continua en pacientes mayores de 4 años. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza que trata la patología para la que se prescribe, médico de atención primaria o geriátrica.</i> <i>Un máximo de 4 absorbentes por persona al día, siendo como máximo uno de ellos de tipo Supernoche.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
PRINCIPIOS ACTIVOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PUEDEN SER INDICADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y QUE REQUIEREN VISADO			
23C	ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA	ABSORB INCONTINENCIA DIA ANATOMICO ABSORB INCONTINENCIA DIA ELASTICO ABSORB INCONTINENCIA DIA RECTANGULAR ABSORB INCONTINENCIA PANTS DIA ABSORB INCONTINENCIA NOCHE ANATOMICO ABSORB INCONTINENCIA NOCHE ELASTICO ABSORB INCONTINENCIA NOCHE RECTANGULAR ABSORB INCONTINENCIA PANTS NOCHE ABSORB INCONTINENCIA SUPER NOCHE ANATOMICO ABSORB INCONTINENCIA SUPER NOCHE ELASTICO ABSORB INCONTINENCIA SUPER NOCHE RECTANGULAR ABSORB INCONTINENCIA PANTS SUPERNOCHE	Incontinencia urinaria y/o fecal continua en pacientes mayores de 4 años. <i>Un máximo de 4 absorbentes por persona al día, siendo como máximo uno de ellos de tipo Supernoche.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
--------------	---------------------	-----------------------	--------------

FÓRMULAS MAGISTRALES QUE REQUIEREN VISADO			
GRUPO ATC	CN	NOMBRE PRESENTACIÓN	INDICACIONES
A11HA04	140083 140084 140561	FM RIBOFLAVINA 100 MG 100 CAPSULAS FM RIBOFLAVINA 10 MG/ML JARABE 250 ML 1 FRASCO FM RIBOFLAVINA 50 MG 100 CAPSULAS	Enfermedades mitocondriales.
	140532	FM EMULSION FOTOPROTECTORA 100 G 1 ENVASE (TIOVEIL 15 %, PARSOL 1789 3 %, NEO-HELIOPAN E1000 5 %) Principios activos: Dioxido titanio Oxibenzona Parsol 1789 Sulisobenzona Neo Heliopan E1000	Prevención de las manifestaciones cutáneas del lupus. Máximo: 4 envases de 100 gramos por persona y año. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en dermatología, reumatología o medicina interna.</i>

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
AUTOVACUNAS INCLUIDAS EN RECETA ELECTRÓNICA			
CN	NOMBRE PRESENTACIÓN	INDICACIONES	
140976	NEOVACCINE INICIO (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 2 VIALES A,B AUTOVACUNA BACTERIANA	Tratamiento y profilaxis de aquellos procesos infecciosos bacterianos crónicos o recurrentes que responden mal a otros tratamientos convencionales: infecciones de las vías respiratorias altas (sinusitis, otitis, rinitis, faringitis, amigdalitis), infecciones de las vías respiratorias bajas (bronquitis y traqueobronquitis). <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en neumología, alergología u O.R.L.</i>	
140977	NEOVACCINE CONTINUACIÓN (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 3 VIALES B,B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140978	NEOVACCINE CONTINUACIÓN (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 2 VIALES B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140985	NEOVACCINE INICIO (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 3 VIALES B,B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140986	NEOVACCINE INICIO (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 2 VIALES B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140996	NEOVACCINE INICIO (CON ANTIBIOGRAMA) GOTAS 2 VIALES A,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140997	NEOVACCINE INICIO (CON ANTIBIOGRAMA) GOTAS 2 VIALES B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140998	NEOVACCINE INICIO (CON ANTIBIOGRAMA) GOTAS 3 VIALES B,B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
140983	URITAI INICIO (SIN ANTIBIOGRAMA) SUBLINGUAL 2 VIALES AUTOVACUNA BACTERIANA	Tratamiento preventivo de procesos urinarios por infección bacteriana y sus complicaciones. <i>Informe de prescripción y diagnóstico por especialista de Osakidetza en urología, nefrología, unidad de enfermedades infecciosas, ginecología o rehabilitación.</i>	
140984	URITAI MANTENIMIENTO (SIN ANTIBIOGRAMA) SUBLINGUAL 1 VIAL AUTOVACUNA BACTERIANA		
140991	URITAI MANTENIMIENTO (SIN ANTIBIOGRAMA) SUBLINGUAL 2 VIALES AUTOVACUNA BACTERIANA		
140992	URITAI INICIO (SIN ANTIBIOGRAMA) SUBLINGUAL 1 VIAL AUTOVACUNA BACTERIANA		
140993	URITAI INICIO (CON ANTIBIOGRAMA) SUBLINGUAL 2 VIALES AUTOVACUNA BACTERIANA		
140990	UROMUNE AUTOVACUNA SPRAY SUBLINGUAL 2 FRASCOS 9 ML		
140979	UROVACCINE INICIO (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 3 VIALES B,B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140980	UROVACCINE INICIO (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 2 VIALES B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140981	UROVACCINE CONTINUACIÓN (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 2 VIALES B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140982	UROVACCINE CONTINUACIÓN (SIN ANTIBIOGRAMA) GOTAS 3 VIALES B,B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		

Actualizado: 01/09/2026

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
140994	UROVACCINE INICIO (CON ANTIBIOGRAMA) GOTAS 2 VIALES B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		
140995	UROVACCINE INICIO (CON ANTIBIOGRAMA) GOTAS 3 VIALES B,B,B AUTOVACUNA BACTERIANA		

GRUPO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES
--------------	---------------------	-----------------------	--------------

VACUNAS INDIVIDUALIZADAS ANTIALÉRGICAS Y AUTOVACUNAS BACTERIANAS <u>EN FORMATO PAPEL</u>		
CN	NOMBRE PRESENTACIÓN	INDICACIONES
	Vacunas individualizadas antialérgicas y autovacunas individualizadas bacterianas en los que en la prescripción permita identificar inequívocamente: composición cualitativa y cuantitativa específica, si se trata de inicio o continuación, marca/laboratorio y vía de administración.	<i>Diagnóstico, informe y prescripción inicial por especialista de Osakidetza en Alergología, Alergología pediátrica, Neumología, ORL, Urología y Ginecología en función del tipo de producto.</i> <i>Recetas de continuación: Especialidad de Osakidetza que inició el tratamiento, o médico de atención primaria/geriatra en los términos previstos en el informe inicial.</i>