

CALENDARIO VACUNAL EN PREMATURIDAD. EUSKADI 2019

(≤ 32 semanas de gestación)

2 MESES	4 MESES	6 MESES	12 MESES	15 MESES
Hepatitis B	Hepatitis B	Hepatitis B	Sarampión	Hepatitis B
Difteria	Difteria	Difteria	Rubéola	Difteria
Tétanos	Tétanos	Tétanos	Parotiditis	Tétanos
Tosferina	Tosferina	Tosferina		Tosferina
Poliomielitis	Poliomielitis	Poliomielitis		Poliomielitis
Haemophilus influenzae b	Haemophilus influenzae b	Haemophilus influenzae b		Haemophilus influenzae b
	Meningococo C		Meningococo C	
Neumococo conjugada	Neumococo conjugada	Neumococo conjugada	Neumococo conjugada	
	Rotavirus			Varicela
		Gripe (al menos hasta los 2 años de edad) ³		

4 AÑOS	6 AÑOS	12 AÑOS	16 AÑOS
Sarampión	Difteria	Papiloma ¹	
Rubéola	Tétanos		Difteria ²
Parotiditis	Tosferina		Tétanos ²
Varicela	Poliomielitis	Meningococo C	



- 1 Sólo niñas. Dos dosis: 2ª dosis a los seis meses de la primera.
- 2 Se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad.
- 3 La primera vez que se vacunen se administrarán dos medias dosis separadas con un con un intervalo mínimo de 1 mes.

GOIZTIAR JAIOTAKOENTZAKO TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2019

(32 haurdunaldi-aste edo gutxiago)

2 HILABETE	4 HILABETE	6 HILABETE	12 HILABETE	15 HILABETE
B hepatitis	B hepatitis	B hepatitis	Elgorria	B hepatitis
Difteria	Difteria	Difteria	Errubeola	Difteria
Tetanosa	Tetanosa	Tetanosa	Parotiditisa	Tetanosa
Kukutxetzula	Kukutxetzula	Kukutxetzula		Kukutxetzula
Poliomielitisa	Poliomielitisa	Poliomielitisa		Poliomielitisa
<i>Haemophilus influenzae b</i>	<i>Haemophilus influenzae b</i>	<i>Haemophilus influenzae b</i>		<i>Haemophilus influenzae b</i>
	C meningokokoa		C meningokokoa	
Neumokoko konjugatua	Neumokoko konjugatua	Neumokoko konjugatua	Neumokoko konjugatua	
	Errotabirusa			Barizela
		Gripea (gutxienez, 2 urte egin arte) ³		

4 URTE	6 URTE	12 URTE	16 URTE
Elgorria	Difteria	Papiloma ¹	
Errubeola	Tetanosa		Difteria ²
Parotiditisa	Kukutxetzula		Tetanosa ²
Barizela ¹	Poliomielitisa	C meningokokoa	



- Neskei bakarrik. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa jarri eta 6 hilabetera.
- Komeni da 65 urterekin oroitzapen-dosia hartzea.
- Txertoa jartzen zaien lehenengo aldian, bi dosi erdi emango zaizkie tartean gutxienez hilabete utzita.