

# CALENDARIO VACUNAL EN PREMATURIDAD. EUSKADI 2020

(≤ 32 semanas de gestación)

| 2 MESES  | 4 MESES                  | 6 MESES | 11 MESES                 | 12 MESES      | 15 MESES |
|--|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|----------|
| Hepatitis B  | Hepatitis B              |         | Hepatitis B              | Sarampión     |          |
| Difteria   | Difteria                 |         | Difteria                 | Rubéola       |          |
| Tétanos  | Tétanos                  |         | Tétanos                  | Parotiditis   |          |
| Tosferina  | Tosferina                |         | Tosferina                |               |          |
| Poliomielitis  | Poliomielitis            |         | Poliomielitis            |               |          |
| Haemophilus influenzae b                               | Haemophilus influenzae b |         | Haemophilus influenzae b |               |          |
|  | Meningococo C            |         |                          | Meningococo C |          |
| Neumococo conjugada                                    | Neumococo conjugada      |         | Neumococo conjugada      |               |          |
| Rotavirus  |                          |         |                          |               | Varicela |
| Gripe (al menos hasta los 2 años de edad) <sup>3</sup> |                          |         |                          |               |          |

| 4 AÑOS      | 6 AÑOS        | 12 AÑOS               | 16 AÑOS               |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Sarampión   | Difteria      | Papiloma <sup>1</sup> |                       |
| Rubéola     | Tétanos       |                       | Difteria <sup>2</sup> |
| Parotiditis | Tosferina     | ACWY meningokokoa     | Tétanos <sup>2</sup>  |
| Varicela    | Poliomielitis |                       |                       |



- 1 Sólo niñas. Dos dosis: 2ª dosis a los seis meses de la primera.
- 2 Se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad.
- 3 La primera vez que se vacunen se administrarán dos dosis separadas con un con un intervalo mínimo de 1 mes.