



A la edad de **15 meses** se administrará **una vacuna** que le protegerá frente a **la Varicela**.

(Para quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2015).



Comparación de los efectos de las enfermedades y de las vacunas

Enfermedad	Efectos de la Enfermedad	Eficacia de la vacuna*	Efectos adversos
Varicela	Infecciones bacterianas secundarias (5-10% de los casos). Zóster (68/100.000 casos). Complicaciones graves en personas adultas.	94-99%	Dolor, enrojecimiento a nivel local (10-20%). Rash tipo variceloso (1-5%). Zóster post vacunal (2,6/100.000 dosis).

* Vacunación completa, nivel de anticuerpos al mes de la última dosis



UMEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2018



15

HILABETE

Barizela



15 hilabeterekin, Barizelatik babestuko duen **txerto bat** jarriko zaio bisitan.

(2015eko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoentzat).



Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

Gaixotasuna

Gaixotasunaren ondorioak

Txertoaren eraginkortasuna*

Ondorio kaltegarriak

Barizela

Infekzio bakteriano sekundarioak (kasuen %5-10).
Zosterra (68/100.000 kasuko).
Konplikazio larriak helduengan.

%94-99

Mina, gorriunea (%10-20).

Barizela motako rasha (%1-5).

Txertoaren ondoko Zosterra (2,6/100.000 dosiko).

* Txerto guztiak, antigorputzen maila azken dositik hilabetera.



CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2018



OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD



15

MESES

Varicela