

GOIZTIAR JAIOTAKOENTZAKO TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2019

(32 haurdunaldi-aste edo gutxiago)

| 2 HILABETE | 4 HILABETE | 6 HILABETE | 12 HILABETE | 15 HILABETE |
|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| B hepatitisia | B hepatitisia | B hepatitisia | Elgorria | B hepatitisia |
| Difteria | Difteria | Difteria | Errubeola | Difteria |
| Tetanosa | Tetanosa | Tetanosa | Parotiditisa | Tetanosa |
| Kukutxetzula | Kukutxetzula | Kukutxetzula | | Kukutxetzula |
| Poliomielitisa | Poliomielitisa | Poliomielitisa | | Poliomielitisa |
| <i>Haemophilus influenzae b</i> | <i>Haemophilus influenzae b</i> | <i>Haemophilus influenzae b</i> | | <i>Haemophilus influenzae b</i> |
| | C meningokokoa | | C meningokokoa | |
| Neumokoko konjugatua | Neumokoko konjugatua | Neumokoko konjugatua | Neumokoko konjugatua | |
| | Errotabirusa | | | Barizela |
| | | Gripea (gutxienez, 2 urte egin arte) ³ | | |

| 4 URTE | 6 URTE | 12 URTE | 16 URTE |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Elgorria | Difteria | Papiloma ¹ | |
| Errubeola | Tetanosa | | Difteria ² |
| Parotiditisa | Kukutxetzula | | Tetanosa ² |
| Barizela ¹ | Poliomielitisa | C meningokokoa | |



- Neskei bakarrik. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa jarri eta 6 hilabetera.
- Komeni da 65 urterekin oroitzapen-dosia hartzea.
- Txertoa jartzen zaien lehenengo aldian, bi dosi erdi emango zaizkie tartean gutxienez hilabete utzita.