

FARMAZIAN EGINDAKO GIB-AREN TEST AZKARRAREN EMAITZA
RESULTADO DEL TEST RÁPIDO DEL VIH EN LA FARMACIA

ESKAERAREN KODEA:
CÓDIGO DE SOLICITUD:

--	--	--

Positiboa, egiaztatu gabe / Positivo, pendiente de confirmación ¹	
Negatiboa / Negativo ²	

Data / Fecha:

Farmaziaren zigilua / Sello de la farmacia:

Sinadura / Firma:

Dokumentu honek informazio-izaera baino ez du:

1. Emaitza positiboa baldin bada, emaitza hori egiaztatut beharko da erreferentziako zentroan egingo diren bestelako analisi espezifikoaegen bidez. Inondik inora ezinago da ezartu GIBaren aurkako seropositibotasunaren diagnostiko bat, test honetan oinarrituta bakarrik.

2. Arriskuak azken praktikatik hiru hilabete, gutxienez, igaro badira, emaitza negatibok haxe esan nahi du: pertsona ez dago GIBaz kutsatuta. Arriskuak azken praktikatik 3 hilabete baino lehenago egingo baldiz, denboraldi hori igaro ondoren testa errepikatu beharko litzateke.

Gogoratu prebentziozko neurriak beti hartu behar direla norbera ez infektatzeko edo beste pertsona batzuk kutsa ez dalezen.

ERREFERENTZIAKO ZENTROAK EMAITZAK POSITIBOAK KONFIRMATZEKO

ARABA: Barne Medikuntza Zerbitzua.

Txagorritxuko Ospitalea. Gasteiz. Tel 945.007009

BIZKAILA: SBTG Kontsulta. Bombero Etخانiz Osasun Zentroa.

Bombero Etخانiz Enparantza, 1. Bilbo. Tel 94.6006969

GIPUZKOA: SBTG Kontsulta. Nafarroa Hiribidea, 4. Donostia. Tel 943.006464

INTERES BEREZIKO TELEFONOAK

Arabako Hiesaren Kontrako Batzordea (Sidalava) 945 257766

Bizkalko Hiesaren Aurkako Batzordea..... 94 4160055

T4 Elkarte..... 94 4221240

Ikarobide..... 94 4449250

Gipuzkoako Hies Kontrako Elkarte (Acasgi) 943 290722

Este documento tiene carácter meramente informativo:

1. Si el resultado es positivo, este debe ser confirmado con otros análisis más específicos en el centro de referencia. En ningún caso se puede establecer un diagnóstico de seropositividad frente al VIH únicamente con este test.

2. Si han transcurrido al menos tres meses desde la última práctica de riesgo, un resultado negativo significa que la persona no está infectada por el VIH. Si se realizase antes de 3 meses desde la última práctica de riesgo, deberá repetirse el test una vez transcurrido ese periodo.

Recuerda que siempre se deben adoptar medidas preventivas para evitar ser infectado/a o infectar a otras personas.

CENTROS DE REFERENCIA PARA CONFIRMACIÓN DE RESULTADOS POSITIVOS

ÁLAVA: Servicio de Medicina Interna.

Hospital de Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz. Tel 945.007009

BIZKAILA: Consulta de ETS, Centro de Salud Bombero Etخانiz.

Plaza Bombero Etخانiz, 1, 1º. Bilbao. Tel 94.6006969

GIPUZKOA: Consulta ETS. Avda de Navarra, 4. Donostia. Tel 943.006464

TELÉFONOS DE INTERÉS

Comisión Antisida de Álava (Sidalava) 945 257766

Comisión Antisida de Bizkaia 94 4160055

Asociación T4 94 4221240

Ikarobide..... 94 4449250

Asociación Antisida de Gipuzkoa (Acasgi) 943 290722