

**OSASUN SAILA**

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

VNC20ko xede-populazioa erakartzea indartzea

Oharraren hartzaileak: Osakidetzako profesionalak, elkargo profesional sanitarioak eta Euskadiko osasun-zentro pribatuen sarea.

Pneumokokoaren aurkako txertaketa da adineko pertsonengan eta arrisku-baldintzak dituztenengan gaixotasun pneumokoziko inbaditzailea eta bestelako konplikazio larriak prebenitzeko neurri eraginkorrenetako bat.

Gripearen eta COVID-19aren aurkako txertaketa-kanpainaren hasiera aukera bereziki egokia da pertsona horien txertaketa-egoera berrikusteko eta, dagokienean, osasun-arreta bereko kontaktuan pneumokokoaren aurkako txertoa eskaintzeko.

Helburu hori lortzeko, honako hau gomendatzen da:

- (1) Xede-populazioaren kaptazio aktiboa indartzea: udazkeneko kanpainaz baliatzea gaixotasuna jasateko arriskua duten pertsonen txertaketa modu aktiboan sustatzeko.
- (2) Pneumokokoaren aurkako txertaketa eguneratzea: 65 urte edo gehiagoko pertsonen eta arrisku-taldeetako pertsonen txertaketa-egoera berrikustea, honako gomendioen arabera:

Aurretiko txertaketa antineumokozikoaren historia	VNC20 gomendioa
TXERTATU GABEA	dosi 1 (ahalik eta lasterren)
VNC13 edo VNC15 txertoa hartuta	Dosi 1 (urtebete igaro ondoren)
VNP23kin txertatua	Dosi 1 (urtebete igaro ondoren)
VNC13+VNP23 (VNP23aren 1 edo 2 dosi)	Dosi 1 (urtebete igaro ondoren)

Refuerzo de captación de población diana de VCN20

Destinatarios de la nota: profesionales de Osakidetza, colegios profesionales sanitarios y red de centros sanitarios privados de Euskadi.

La vacunación frente al neumococo constituye una de las medidas más efectivas para prevenir la enfermedad neumocócica invasora y otras complicaciones graves en las personas de mayor edad y en aquellas con condiciones de riesgo.

El inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 representa una oportunidad especialmente favorable para revisar la situación vacunal de estas personas y ofrecer, cuando proceda, la vacunación frente al neumococo en el mismo contacto asistencial.

Para lograr este objetivo se recomienda:

- (1) Reforzar la captación activa de la población diana: aprovechar la campaña de otoño para promover activamente la vacunación de las personas susceptibles.
- (2) Actualizar la vacunación antineumocócica: revisar la situación vacunal de las personas de 65 o más años y en grupos de riesgo de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

Historia de vacunación antineumocócica previa	Recomendación VCN20
NO VACUNADO	1 dosis (lo antes posible).
Vacunado con VNC13 o VNC15	1 dosis (transcurrido un año de la última vacuna antineumocócica).
Vacunado con VNP23	1 dosis (transcurrido un año de la última vacuna antineumocócica).
Vacunado con VNC13 + VNP23 (1 o 2 dosis)	1 dosis (transcurrido un año de la última vacuna antineumocócica).

VNC20 edo VNC21rekin txertatua	Ez da dosi gehigarrik behar (jarraibide osatua).	de VNP23) Vacunado con VCN20 o VCN21	antineumocócica). No requiere ninguna dosis adicional (pauta completada).
--------------------------------	--	---	--

(3) Batera administratzea: 20 balentziako txerto pneumokoziko konjugatua gripe estazionalaren aurkako txertoarekin eta/edo COVID-19aren aurkako txertoarekin batera administra daiteke.

(3) Coadministración: la vacuna antineumocócica 20-valente se puede administrar de forma concomitante con la vacuna frente a la gripe estacional y/o frente a COVID-19.

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean

En Vitoria-Gasteiz a fecha de la firma

GUILLERMO
IGNACIO
HERRERO
ALAÑA -
14254007X

Firmado digitalmente
por GUILLERMO
IGNACIO HERRERO
ALAÑA - 14254007X
Fecha: 2026.09.17
13:02:15 +02'00'

Guillermo Guerrero Aldaña

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila
Director de Salud Pública y Adicciones/ Departamento de Salud