

**OSASUN SAILA**

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

IMMUNOESKASIA KONBINATU LARRIKO JAIOPERRIEN BCG TXERTAKETA

Gaur egun, jaioperrien artean BCG txertoa jartzea gomendatzen da paziente hauetan:

- tuberkulosi handia* duten herrialdeetatik etorritako familiekin bizi badira (>40 kasu 100.000 biztanleko),
- maiz eta 3 astetik gorako aldietan herrialde horietara bidaiatzen dutenak: [TB profile](#),
- gizarte-bazterketa jasateko arrisku larriari dauden familietakoak badira, pediateraren iritziz,
- ama GIBdunak, GIB infekzioa baztertu ondoren,
- beste arrisku-egoera batzuk, pediateraren iritziz.

2026ko maiatzetik aurrera, Osakidetza immunoeskasia konbinatu larriaren detekzioa sartuko du jaioperrien baheketa-programaren barruan. BCG eta beste txerto bizi arindu batzuen txertaketa kontraindikaturak dago probaren emaitza positiboa edo zalantzazkoa bada. Beraz, txertoa hartzea gomendatzen zaien pazienteen kasuan, emaitza negatiboa izan arte itxarongo da txertaketa hasteko.

VACUNACION BCG EN NEONATOS CON IMMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE

Actualmente, la vacunación con BCG en población recién nacida está indicada en pacientes que:

- sean convivientes de familias procedentes de países con alta endemia de TB* (>40 casos por 100.000 habitantes),
- que viajan con frecuencia y durante periodos > 3 semanas a esos países: [TB profile](#),
- pertenecen a familias en grave riesgo de exclusión social, a juicio de su pediatra,
- de madres VIH positivas tras descartar infección por VIH,
- otras situaciones de riesgo a criterio de su pediatra.

A partir de mayo del 2026 Osakidetza incorporará dentro del programa del cribado neonatal la detección de la inmunodeficiencia combinada grave. La vacunación con BCG y otras vacunas vivas atenuadas está contraindicada en caso de resultado positivo o dudoso en la prueba. Por lo tanto, en pacientes que esté indicada la vacunación se esperará hasta resultado negativo para iniciar la vacunación.

Vitoria-Gasteiz, sinatzen den egunean/ Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma

Guillermo Herrero Alaña
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila