

**OSASUN SAILA**

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

**EUSKADIN GIZA PAPILOMAREN BIRUSAREN
AURKAKO TXERTOA JARTZEKO GOMENDIOAK
EGUNERATZEA.**

2026ko iraila

Aurrekariak

Giza papilomaren birusaren (GPB) aurkako txertaketa sistematikoa Euskadiko haurren txertaketa-egutegian sartu zen, 1995ean jaiotako 13 urteko neskentzat. Txertaketa eskola-ingurunean egin zen 2007/2008 ikasturtean Bigarren Hezkuntzako 1. mailako neskei, txerto tetravalente batekin, eta jarraibidea 3 dosikoa zen, lehenengo eta bigarren dosien artean hilabeteko tartearekin eta bigarren eta hirugarren dosien artean 6 hilabeteko tartearekin (0, 1 eta 6 hilabete). Ordutik, programa horrek aldaketak izan ditu, arrisku-baldintza jakin batzuk dituzten pertsonen txertaketa barne.

2014/2015 ikasturtean (2003an jaiotakoak), txertaketa-estaldurak hobetzeko, txertaketa-adina 12 urtera jaitsi zen, eta Lehen Hezkuntzako 6. mailan txertatu zen, jarraibide berari eutsiz, txerto tetravalentearekin eta neskei soilik txertatuz.

2018/2019 ikasturtean (2007an jaiotakoak), txerto tetravalentearen ordeztu, txerto nonabalentea jarri zen. Txertaketak 12 urterekin jarraitu zuen, Lehen Hezkuntzako 6. mailan, jarraibide berari eutsiz eta neskak bakarrik txertatuz.

2020/2021 ikasturtean (2009an jaiotakoak), 3 dosiko jarraibidearen ordeztu, 2 dosiko jarraibidea ezarri zen, dosien arteko 6 hilabeteko tartearekin.

**ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PARA
LA VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO EN EUSKADI.**

Septiembre 2026

Antecedentes

La vacunación sistemática frente al virus de papiloma humano (VPH) se introdujo en el calendario de vacunación infantil del País Vasco para niñas a la edad de 13 años nacidas en 1995. La vacunación se realizó en el entorno escolar en el curso 2007/2008 a niñas en 1º de Educación Secundaria con una vacuna tetravalente y la pauta era de 3 dosis, con un intervalo de un mes entre la primera y segunda dosis y otro intervalo de 6 meses entre la segunda y tercera dosis (0, 1 y 6 meses). Desde entonces, este programa ha tenido cambios, incluyéndose la vacunación de personas con ciertas condiciones de riesgo.

En el curso 2014/2015 (nacidas en 2003), con el fin de mejorar las coberturas de vacunación se bajó la edad de vacunación a los 12 años, vacunando en 6º de Educación Primaria, manteniendo la misma pauta, con la vacuna tetravalente y vacunando sólo a las niñas.

En el curso 2018/2019 (nacidas en 2007), se sustituyó la vacuna tetravalente por vacuna nonavalente. La vacunación continuó a la edad de 12 años, en 6º de Educación Primaria, manteniendo la misma pauta y vacunando sólo a las niñas.

En el curso 2020/2021 (nacidas en 2009), se sustituyó la pauta de 3 dosis por la pauta de 2 dosis, con 6 meses de intervalo de separación entre las dosis.

OSASUN SAILA

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

2023/2024 ikasturtean (2012an jaiotakoak) txertaketa-programa zabaldu zen, eta mutilak ere sartu ziren.

Euskadiko Txertoen Aholku Batzordeak **txerto horren jarraibidea aldatzea gomendatu zuen, 2 dositik dosi batera, 12 urteko haurrentzat**, Euskal Autonomia Erkidegoko haurren txertaketa-egutegian. Gomendio hori honako hauetan oinarritu zen: OMEren gomendioetan, Osasun Ministerioaren Txertaketen Programari eta Erregistroari buruzko Ponentziaren gomendioen berrikuspenean eta 2 dosiko pautatik dosi batera pasatzea bermatzen duen ebidentzia zientifikoa.

2024/2025 ikasturtean, GPBren aurkako txertoaren dosi 1 duen txertaketa-jarraibide berria ezarri zen eskola-eremuan, 2013an jaiotako ikasleentzat, Lehen Hezkuntzako 6. mailan.

2024/2025 eta 2025/2026 ikasturteetan 2009an, 2010ean eta 2011n jaiotako mutilak txertatu dira.

GPBaren aurkako txertaketa-gomendio berriak ezartzeko estrategia

1. Ezohiko kanpaina 2027ko urtariletik

Txertaketa osasun-zentroan

Aldatu egin da 2025-2026 ikasturterako aurreikusita dagoen atzemate-estrategia giza papilomaren birusaren aurkako txertoa aurretik txertorik hartu ez duten gizonentzat.

Hasierako plangintzak 2007an eta 2008an (18 urte arte) eta, bigarren fase batean 2001 eta 2006 artean (25 urte arte) jaiotakoen txertaketa jasotzen zuen. Azkenik, esku-hartzea 2027ko urtariletik aurrera egingo da osasun-zentroetan eta, 2008an jaiotako mutilentzat izango da, bai eta 2009tik 2014ra bitartean jaiotako eta txertoa jaso ez duten mutilen erreskate-kohorteentzat ere.

En el curso 2023/2024 (nacidos y nacidas en 2012) se amplió el programa de vacunación incluyendo también a los niños.

El Comité Asesor de Vacunas de Euskadi recomendó el **cambio en la pauta de esta vacuna de 2 dosis a 1 dosis en niños y niñas a la edad de 12 años**, en el calendario de vacunación infantil del País Vasco. Esta recomendación se basó en las recomendaciones de la OMS, en la revisión de las recomendaciones de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad y en la evidencia científica que avala el paso de una pauta de 2 dosis a 1 dosis.

La nueva pauta de vacunación con 1 dosis de vacuna frente a VPH se implantó en el ámbito escolar durante el curso 2024/2025, para el alumnado nacido en 2013, en 6º de Primaria.

En los cursos escolares 2024/2025 y 2025/2026 se llevó a cabo el catch up de los chicos nacidos en 2009, 2010 y 2011.

Estrategia de implantación de las nuevas recomendaciones de vacunación frente al VPH

1. Campaña extraordinaria desde enero 2027

Vacunación en centro de salud

La estrategia de captación prevista para el curso 2025-2026 para la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) en chicos no vacunados previamente ha sido modificada.

La planificación inicial contemplaba la vacunación de los nacidos en 2007 y 2008 (hasta los 18 años) y en una segunda fase de los nacidos entre 2001 y 2006 (hasta los 25 años).

Finalmente, la intervención se realizará en los centros de salud a partir de enero de 2027 y estará dirigida a los varones nacidos en 2008, así como a las cohortes de rescate correspondientes a los varones

OSASUN SAILA

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

Osasun zentroetan txertatuko diren mutilen atzematea SMS mezuen bidez egingo du Osakidetza.

2. Arrisku-taldeetako edo osasun-baldintzen arabera pertsonengan

2022ko urrian, GPBaren aurkako txertaketa-programaren helburu orokorra zabaldu zen: bi sexueta infekzio iraunkorra eta GPBarekin lotutako gaixotasunak prebenitzea, genotipo eragilea edozein zela ere, eta zerbixean, eremu anogenitalean eta buru eta lepoan kokatuak zeudenak.

Birusen aurkako txertaketa-gomendioak 2024ko otsailean berrikusi ziren berriro. Immunoeskasia dakarten baldintza jakin batzuk dituzten pertsonen txertaketa-adina handitu egin da, eta aurretik txertoa hartu ez duten eta adinaren arabera erakarrirako pertsonen txertaketa-jarraibidearen dosi-kopurua murriztu egin da. GPIen aurkako txertaketa-gomendioak:

1. **Arrisku-egoera** jakin batzuk dituzten txertorik gabeko pertsonak, **45 urte bete arte** (barne). **Dosi bat** 25 urtera arte, eta **2 dosi** 26 urtetik aurrera, gutxienez 6 hilabetez bereizita:

- Gizonekin sexu-harreman arriskutsuak dituzten gizonak.
- Prostituzio-egoera.
Aurreko gomendioetako edozeinetan, 3 dosiko pauta bat aplikatuko da immunosupresio-egoera bat batera gertatzen bada.

2. **Immunosupresioarekin** dauden **45 urtera arteko** (barne) txertoa hartu ez duten pertsonen kasuan, **3 dosiko** pauta (0, 1-2 eta 6 hilabete) gomendatzen da beti, arrisku-talde hauetakoak

nacidos entre 2009 y 2014 que no hayan recibido previamente la vacuna.

La captación de los chicos para la vacunación en centros de salud se realizará mediante el envío de mensajes SMS por parte de Osakidetza.

2. En personas pertenecientes a grupos de riesgo o por condiciones de salud

En octubre de 2022 se amplió el objetivo general del programa de vacunación frente a VPH, a la prevención en ambos sexos de la infección persistente y de las enfermedades relacionadas con el VPH, independientemente del genotipo causante, localizadas en cérvix, área anogenital y cabeza y cuello.

Las recomendaciones de vacunación frente a VPH se revisaron de nuevo en febrero de 2024. Se ha aumentado la edad de vacunación en personas con ciertas condiciones que implican inmunosupresión y ha reducido el número de dosis de la pauta de vacunación en personas previamente no vacunadas captadas por edad. Recomendaciones de vacunación frente a VPH:

1. Personas no vacunadas con determinadas **situaciones de riesgo hasta los 45 años** (incluidos). Pauta de **1 dosis** hasta los 25 años y **2 dosis** a partir de los 26, separadas al menos 6 meses:

- Hombres que tienen relaciones sexuales de riesgo con hombres.
- Situación de prostitución.

En cualquiera de las recomendaciones anteriores se aplicará una pauta de 3 dosis si coexiste una situación de inmunosupresión.

2. En personas no vacunadas con **inmunosupresión hasta los 45 años** (incluidos), pertenecientes a los siguientes grupos de riesgo, se recomienda siempre una pauta de **3 dosis** (0,

OSASUN SAILA

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

badira, txertatzen hasteko adina edozein dela ere:

- WHIM sindromea (IDP): 6 eta 11 motak estaltzen dituen txertoa.
- GIB bidezko infekzioa.
- Organo solidoaren edo ama zelula hematopoietikoen transplantea (ZAHTaren aurretiko txertaketa-egoera edozein dela ere).
- Azatioprina edo anti-TNF tratamenduan dauden emakumeak.
- Lehen mailako immunoeskasi batzuk.

3. taula: Txertaketa immunoeskasia primarioak dituzten pertsonekin [7-Kapitulua.pdf](#).

Aurretik dosi batekin edo birekin jarraibidea jaso badu, osatu txertaketa 3 dosiraino.

3. **Zerbixean maila altuko lesio intraepitelialaren ondoriozko edozein tratamendu jaso duten emakumeak (CIN2+), adina edozein dela ere.** 3 dosiko jarraibidea (0, 1-2 eta 6 hilabete). Ahal dela, txertoa lesioa tratatu aurretik jarriko da, edo, ezin bada, tratamendua amaitu eta lehenbailehen.

1-2 y 6 meses), independientemente de la edad de comienzo de la vacunación:

- Síndrome WHIM (IDP): vacuna que cubra tipos 6 y 11.
- Infección por VIH.
- Trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos (independientemente del estado de vacunación previo en TPH).
- Mujeres en tratamiento con azatioprina o anti TNF.
- Algunas inmunodeficiencias primarias.

Tabla 3: Vacunación en personas con inmunodeficiencias primarias (errores innatos de la inmunidad) [Capítulo-7.pdf](#).

Si ha recibido pauta con una o dos dosis con anterioridad, completar vacunación hasta 3 dosis.

3. **Mujeres, independientemente de la edad, que hayan recibido cualquier tratamiento por lesión intraepitelial de alto grado en cérvix (CIN2+).** Pauta de 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses). La vacunación se realizará preferentemente antes del tratamiento de la lesión o, si no es posible, cuanto antes después de finalizar el tratamiento.

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean

En Vitoria-Gasteiz, a fecha de la firma

GUILLERMO
IGNACIO
HERRERO
ALAÑA -
14254007X

Firmado digitalmente
por GUILLERMO
IGNACIO HERRERO
ALAÑA - 14254007X
Fecha: 2026.09.01
10:27:16 +02'00'

Guillermo Herrero Alaña

Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria / Director de Salud Pública y Adicciones