



HIRUKOITZ BIRIKOAREN (elgorria, errubeola, hazizurriak) AURKAKO TXERTO A HARTZEKO GOMENDIOEN OROIGARRIA ADIN UGALKORREAN DAUDEN EMAKUMEENTZAT

2026ko maiatza

Sortzetiko errubeola larritasun bereziko gertaera da Osasun Publikoan, eta txertaketa-estrategia egoki baten bidez prebenitu daiteke. Infekzio horren aurkako babesa adin emankorrean dauden emakumeen immunitate-estaldura handiak lortzearen eta mantentzearen mende dago.

[Euskadiko Txertaketa eta Immunizazioen Eskuliburuak](#) adierazten duen bezala, errubeolaren aurkako immunizatutzat honako hauek betetzen dituzten emakumeak hartuko dira kontuan:

- **txerto hirukoitz birikoaren bi dosi dokumentatu**, behar bezala emanda, emaitza serologikoa edozein dela ere, **edo**
- **serologia positiboa** errubeola dokumentatuaren aurrean.

Ez da beharrezkoa serologiarik egitea haurdunaldi bakoitzean, immunitate dokumentatua bada. Txerto hirukoitz birikoaren (HB) bi dosi dokumentatu dituzten emakumeek ez dute atzera egin behar, serologia negatiboa bada ere.

Gogoan izan komeni dela txertaketa-egoera berrikustea eta haurdunalditik kanpoko txertaketa oportunistak indartzea, erdiberriarora barne, [Euskadiko Txertaketa eta Immunizazioen Eskuliburuaren](#) arabera.

Jarduteko gomendioak

Sortzetiko errubeolaren prebentzioa optimizatzeko, honako hauen beharra gogorarazten da:

- Adin emankorrean dauden emakumeen txertaketa-egoera dokumentatua berrikustea.
- Adierazi txertaketa HBarekin soilik haurdunalditik kanpo, soilik immunitate dokumentaturik ez dagoenean.

RECORDATORIO DE LAS RECOMENDACIONES PARA LA VACUNACIÓN FRENTE A LA TRIPLE VÍRICA (Sarampión-Rubéola-Parotiditis) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL

Mayo de 2026

La rubéola congénita constituye un evento de especial gravedad en Salud Pública, prevenible mediante una adecuada estrategia de vacunación. La protección frente a esta infección depende de alcanzar y mantener altas coberturas de inmunidad en mujeres en edad fértil.

Tal y como indica el [Manual de Vacunaciones e Inmunizaciones de Euskadi](#), se **consideran inmunes frente a la rubéola** las mujeres que presentan:

- **dos dosis documentadas** de vacuna triple vírica, administradas correctamente, con independencia del resultado serológico, **o**
- **serología positiva** frente a rubéola documentada.

No es necesario realizar serologías en cada embarazo si existe inmunidad documentada. **Las mujeres con dos dosis documentadas de vacuna triple vírica (TV) no deben revacunarse, incluso si la serología es negativa.**

Se recuerda la conveniencia de revisar el estado vacunal y reforzar la vacunación oportunista fuera del embarazo, incluido el puerperio, conforme al [Manual de Vacunaciones e Inmunizaciones de Euskadi](#).

Recomendaciones de actuación

Con el fin de optimizar la prevención de la rubéola congénita, se recuerda la necesidad de:

- Revisar el estado vacunal documentado de las mujeres en edad fértil.
- Indicar vacunación con TV exclusivamente fuera del embarazo, únicamente en ausencia de inmunidad documentada.



OSASUN SAILA
Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Viceconsejería de Salud y Transformación digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

- Txertaketa oportunistaren aukerak aprobetxatzea, [Txertaketa eta Immunizazioen Euskadiko Eskuliburuan](#) ezarritako irizpideen arabera.
- Aprovechar las oportunidades de vacunación oportunista, incluido el puerperio inmediato, conforme a los criterios establecidos en el [Manual de Vacunaciones e Inmunizaciones de Euskadi](#).

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean

En Vitoria-Gasteiz, a fecha de la firma

Guillermo Herrero Alaña
Director de Salud Pública y Adicciones