

**OSASUN SAILA**

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

COVID-19aren aurkako immunizazioa 2026-2027 denboraldian. COVID-19aren aurkako txertoa ematea Bimervax® XFG

Proteina birkonbinatuzko txerto bat da, eta, eman ondoren, erantzun immune bat sortzen du, humoral zein zelularra, SARS- CoV-2 proteinaren (S) proteina espikularen hartzailearen antígenoaren (RBD) aurrean. Birus bizirik edo genoma osorik ez duenez, txertoak ez du erreplikatzeko gaitasunik eta ezin du infekziorik sortu.

Argibideak

- Infekzioaren prebentzioa txertatutako 12 urteko eta gehiagoko pertsonengan
- EZ da beharrezkoa aurretik COVID-19aren aurkako RNAm txertoa emanda izatea.
- Txertorik hartu ez duten edo RNAm-ko txertoen aurkako erreakzio larrien ondorioz txertoak hartu ez dituzten 12 urte edo gehiagoko pertsonen lehen txertaketa, osagaiekaren bati alergia-aurrekariak izateagatik, veste jarraibide mediku batzuegatik txerto hauek saihestea gomendatzen dutenak edo beste egoera batzuk.

Aurkezpena

Txertoa fabrikatik dator, aurrez kargatutako 10 xiringa dituen bilgarri batean. Aurrez kargatutako xiringa bakoitzak 0,5 ml-ko dosia du.

Kontserbazioa eta garraioa
2°C eta 8°C. Argitik babestua. Urtebeteko kontserbazio-aldia.

Administrazio-bidea

Muskulu barnekoa, posible bada deltoide-muskulan.

Jarraibidea

Dosi bat, COVID-19aren aurkako aurretiazko txertaketa-egoera edozein dela ere.

Tartea aurretiko dosiarekin edo infekzioarekiko
3 hilabete jasotako txertoaren azken dositik edo dokumentatutako infekziotik, aurretik jasotako dosi kopurua edozein dela ere.

Inmunización frente a la COVID-19 en la temporada 2026-2027. Administración de la vacuna frente a COVID-19 Bimervax® XFG

Es una vacuna de proteína recombinante que tras la administración genera una respuesta inmune, tanto humoral como celular, frente al antígeno del receptor (RBD) de la proteína de la espícula (S) recombinante del SARS- CoV-2.

Al no contener virus vivos ni genoma completo, la vacuna no tiene capacidad replicativa y no puede producir la infección.

Indicaciones

- Prevención de la infección en personas de 12 y más años vacunados
- NO es necesario vacunación previa con vacuna ARNm frente a COVID-19.
- Primovacunación en personas de 12 y más años no vacunadas o incompletamente vacunadas por reacciones adversas graves a las vacunas de ARNm, por antecedentes de alergia a alguno de sus componentes, por otras indicaciones médicas que recomiendan evitar la vacunación con estas vacunas u otras circunstancias.

Presentación

La vacuna viene de fábrica en un embalaje que contiene 10 jeringas precargadas. Cada jeringa precargada contiene una dosis de 0,5 ml.

Conservación y transporte

2°C y 8°C. Protegido de la luz. Periodo de conservación 1 año.

Vía administración

Intramuscular, preferentemente en músculo deltoides.

Pauta

Una dosis independientemente del estado de vacunación previa contra la COVID-19.

Intervalo con dosis previa o infección

3 meses de la última dosis de vacuna recibida o infección documentada, independientemente del número de dosis recibidas con anterioridad.



OSASUN SAILA

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

Kontraindikazioak

Printzipio aktiboarekiko edo txertoaren osagaietako batekiko hipersentikortasun-erreakzioa.

Contraindicaciones

Reacción de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los componentes de la vacuna.

Haurdunaldia

eta

edoskitzea

Emakume haurdunen artean ez dago ebidentziarik. Haurdunei RNAm txertoak jartzea gomendatzen da haurdunaldiaren edozein hiru hilabetera. Bularra ematen duen amak jaso dezake txertoa. Ez litzateke beharrezkoa izango edoskitzea etetea txertoa jarri eta hurrengo egunetan.

Embarazo y lactancia

No hay evidencia en mujeres embarazadas. Se recomienda la vacunación de embarazadas con vacunas de ARNm en cualquier trimestre del embarazo. Puede recibir la vacuna una madre que amamanta. No sería necesario suspender la lactancia durante los días posteriores a la vacunación.

Segurtasuna

Oraindik ez da ezarri Bimervaxen segurtasuna eta eraginkortasuna 12 urtetik beherakoan artean. Kontrako erreakzio ohikoenak hauek izan ziren: mina injezio-lekuan (>80%), nekea eta zefalea (>30%) eta mialgiak (>20%). Kontrako erreakzioak, oro har, arinak edo ertainak izan ziren, eta 3 egun edo gutxiago iraun zuten.

Seguridad

No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Bimervax en la población menor de 12 años. Las reacciones adversas más frecuentes fueron dolor en el lugar de inyección (>80%), fatiga y cefalea (>30%) y mialgias (>20%). Las reacciones adversas fueron generalmente de intensidad leve a moderada con una duración inferior o igual a 3 días.

Erabiltzeko**gomendioak**

Txertoaren ezaugarrietan oinarrituta, eta CAVEaren gomendioak kontuan hartuta, honako hauetan erabiltzea gomendatzen da:

Recomendaciones de utilización

En base a las características de la vacuna, y tomando en consideración las recomendaciones del CAVE se recomienda su uso en:

- Paziente instituzionalizatuak.
- Ospitaleko kontsulta espezializatueta txertatzen diren arrisku handiko pazienteak, hala nola medikuntza prebentiboko eta infektologia pediatrikoko pazienteak.
- Etxeko arreta zerbitzuko pazienteen txertaketa.
- RNAm txertoetarako kontraindikazioa duten pertsonak
- Gainerako arrisku-taldeetako pazienteak, edozein arrazoiengatik kanpainan txertatuko ez direnak eta urteko gainerako egunetan harrapatuko dituztenak.

- Pacientes institucionalizados.
- Pacientes de alto riesgo que se vacunan en las consultas hospitalarias especializadas como Medicina Preventiva e Infectología pediátrica.
- Vacunación en atención domiciliaria.
- Personas con contraindicación para vacunas ARNm
- Pacientes del resto de grupos de riesgo que por cualquier motivo no se vacunarán durante la campaña y sean captados durante el resto del año.

Gainerako dosiak ESlen artean bana daitezke, RNAm txertoekin batera emateko, izakinak amaitu arte.

El resto de las dosis pueden ser distribuidas entre las OSI para su administración indistintamente junto con las vacunas ARNm hasta finalizar existencias.

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean/ Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma

GUILLERMO
IGNACIO HERRERO
ALAÑA - 14254007X

Firmado digitalmente por
GUILLERMO IGNACIO
HERRERO ALAÑA - 14254007X
Fecha: 2026.09.21 12:44:28
+02'00'

Guillermo Herrero Alaña

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila