



Oharraren hartzaileak: Osakidetzako profesionalak, elkargo profesional sanitarioak eta Euskadiko osasun-zentro pribatuen sarea.

Txertaketen egutegia etengabe berrikusten ari da, azken ebidentzia zientifikoetan eta erakunde teknikoen gomendioetan oinarrituta eguneratzeko. Ildo horretan, Euskadiko Txertoen Aholku Batzordeak 2025erako emandako gomendioak kontuan hartuta, Osasun Sailak honako eguneratze hauek egingo ditu Euskadiko txertatze-eta immunizazio-programetan:

2025ERAKO ALDAKETAK HELDUEN TXERTAKETA-EGUTEGIAN

Pneumokokoaren aurkako txerto konjugatua, 20 balentea (VNC20)

Pneumokokoaren aurkako txertaketa gomendatuta egongo da helduentzat, ondoren jasotzen den lehentasun-ordenari jarraituz:

(1) Honako baldintza **arrisku handikoak** betetzen dituzten pazienteetan hauek txertaketa aktiboa gomendatzen da:

- GIB infekzioa duten pertsonak, pneumokokoaren aurkako txerto konjugatu 13 balenterik (VCN13) jaso ez dutenak.
- Paziente asplenikoak, esplenektomizatuak edo esplenektomia programatua dutenak, osagarriaren eskasia dutenak eta eculizumab, ravilizumab eta pegcetacoplan bidezko tratamendua jasotzen dutenak.
- LZR fistula, kokleako inplanteak.
- Lehen mailako beste immunoeskasia batzuk edo sortzetiko immunitate-gabeziak, sortzetiko immunitateari eta/edo egokitze-immunitateari eragiten diotenak (humorala, zelularra edo biak).
- Kimioterapia edo tratamendu biologikoak dituzten paziente onkologikoak.
- Farmako immunosupresoreak hartzen dituzten pazienteak.
- Organo solidoaren transplantea jaso duten edo jasotzeko zain dauden pazienteak.

Destinatarios de la nota: profesionales de Osakidetza, colegios profesionales sanitarios y red de centros sanitarios privados de Euskadi.

El calendario de vacunaciones está en continua revisión para actualizarlo en base a las últimas evidencias científicas y recomendaciones de los organismos técnicos. En este sentido, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi para 2025, el Departamento de Salud realizará las siguientes actualizaciones en los programas de vacunación e inmunización de Euskadi:

CAMBIOS EN EL CALENDARIO VACUNAL DE LA POBLACIÓN ADULTA PARA EL AÑO 2025

Vacuna antineumococica conjugada 20 valente (VNC20)

La vacunación antineumocócica estará recomendada en población adulta siguiendo el orden de priorización que se recoge a continuación:

(1) En pacientes con las siguientes **condiciones de alto riesgo** se recomienda realizar una captación activa:

- Personas con infección por VIH que no han recibido la vacuna antineumococica conjugada 13 valente (VCN13).
- Pacientes asplénicos, esplenectomizados o con esplenectomía programada, déficit del complemento y los que reciben tratamiento con eculizumab, ravilizumab y pegcetacoplan.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear.
- Otras inmunodeficiencias primarias o déficits congénitos de la inmunidad que afectan a la inmunidad innata y/o adaptativa (humoral, celular o a ambas).
- Pacientes oncológicos con quimioterapia o tratamientos biológicos.
- Pacientes que toman fármacos inmunosupresores.
- Pacientes que han recibido un trasplante de órgano sólido o están en espera de recibirlo.
- Pacientes con insuficiencia renal crónica en estadios 4/5 o en diálisis, Síndrome nefrótico.

- Giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa duten pazienteak 4/5 estadioetan edo dialisian, síndrome nefrotikoa.
- Guraso hematopoietikoen transplantea duten pazienteak eta/edo CAR-T terapia jaso dutenak (eta txertaketa-egutegia betetzen ari direnak).
- Gibleko gaixotasun kronikoa, alkoholismo kronikoa eta zirrosia.

Paziente horietan, txertaketa-historiaren arabera, VNC20 txerto berria adieraziko da, taulan adierazten den bezala:

VNC13+VNP23 jarraibide sekuentziala ordezkatzeari	
Aurretiko txertaketa antineumokokozikoaren historia	VNC20 administratzeko gomendioa
TXERTATU GABEA	dosi 1 ahalik eta lasterren
VNC13 txertoa hartuta	Dosi 1 urtebete igaro ondoren
VNP23 txertoa hartuta	Dosi 1 urtebete igaro ondoren
VNC13+VNP23 txertoa hartuta	Dosi 1 5 urte igaro ondoren
VNC13+VNP23+VNP23 txertoa hartuta	Ez du dosi gehigarrik behar

VPN23: Txerto antineumokokoziko polisakaridoa 23 balentea

(2) Honako **arrisuku baldintza kroniko hauek** hauek dituzten pertsonengan txertaketa oportunitate gomendatzen da:

- Diabetesa.
- Gaixotasun kroniko kardiobaskularrak, gutxiegitasun kardiakoa, egonkortasun klinikoko egoeran NYHAren II. mailan egondakoa (sintomak jardura fisiko ohikoarekin), kardiopatia iskemikoa, atake zerebrobaskularra.
- BGBK, egonkortasun klinikoko egoeran MRCren 2. mailako disnea izan duena (disnea, ordekan, ohiko erritmoan oinez), edo FEV1 < %65 edo O2 saturazioa < %90.

Aurretik pneumokokozikoaren aurkako txertorik jaso ez duten pertsonen zuzenduta dago, taulan jasotzen den bezala:

VNP23 txertoaren ordezkari VNC20 jartzea	
Aurretiko txertaketa antineumokokozikoa	VNC20 administratzeko gomendioa
TXERTATU GABEA	Dosi 1
VNC13 txertoa hartuta	Ez du dosi gehigarrik behar
VNP23 txertoa hartuta	Ez du dosi gehigarrik behar
VNC13+VNP23 txertoa hartuta	Ez du dosi gehigarrik behar
VNC13+VNP23+VNP23 txertoa hartuta	Ez du dosi gehigarrik behar

- Pacientes con Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y/o que hayan recibido terapia CAR-T (y que estén completando su calendario de vacunaciones).
- Cirrosis, hepatopatía crónica y alcoholismo.

En estos pacientes según la historia de vacunación, se indicará la vacuna VNC20 como se indica en la tabla:

Sustitución de la pauta secuencial VNC13+VNP23	
Historia de vacunación antineumocócica previa	Recomendación de administración de VNC20
NO VACUNADO	1 dosis lo antes posible
Vacunado con VNC13	1 dosis transcurrido un año
Vacunado con VNP23	1 dosis transcurrido un año
Vacunado con VNC13+VNP23	1 dosis transcurridos 5 años
Vacunado con VNC13+VNP23+VNP23	No requiere ninguna dosis adicional

VPN23: Vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente

(2) En personas que presentan las siguientes **condiciones crónicas de riesgo** se recomienda una vacunación oportunitaria:

- Diabetes.
- Enfermedad cardiovascular que presenta insuficiencia cardíaca que en situación de estabilidad clínica haya estado en grado II de la NYHA (síntomas con la actividad física habitual), Cardiopatía isquémica o Ataque cerebrovascular
- EPOC que en situación de estabilidad clínica haya estado con disnea grado 2 de la MRC (disnea a paso habitual en llano), o FEV1<65% o saturación O2 < 90%.

La indicación está dirigida a las personas que no han sido vacunadas anteriormente con ninguna vacuna antineumocócica, como se recoge en la tabla:

Sustitución de la vacuna VNP23 por VNC20	
Vacunación antineumocócica previa	Recomendación de administración de VNC20
NO VACUNADO	1 dosis
Vacunado con VNC13	No requiere ninguna dosis adicional
Vacunado con VNP23	No requiere ninguna dosis adicional
Vacunado con VNC13+VNP23	No requiere ninguna dosis adicional
Vacunado con VNC13+VNP23+VNP23	No requiere ninguna dosis adicional

Lehentasuna dute 1. puntuan jasotako baldintzek, bereziki immunitate-sistema arriskuan jar dezaketen egoera klinikoek. Euskadiko Txertaketa eta Immunizazioen Eskuliburuko gomendioak berrikustea gomendatzen da arrisku taldeei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero.

(3) 65 urte edo gehiagoko helduen artean:

Pneumokokoaren aurkako VNP23 txertoaren ordeztu, VCN20 jarriko da. Ordezkapena pixkanaka egingo da eta **lehentasuna emango zaie 75 urte edo gehiagoko pertsonari**, adinaren arabera arriskua baino ez badute. Txertaketa oportunistak gomendatzen da.

VNP23 txertoaren ordeztu VNC20 jartzea	
Aurretiko txertaketa antineumokokozikoa	VNC20 administratzeko gomendioa
TXERTATU GABEA	Dosi 1
VNP23 txertoa hartuta	Ez du dosi gehigarririk behar

Tienen prioridad las condiciones incluidas en el punto 1, especialmente las situaciones clínicas que puedan comprometer al sistema inmunitario. Se recomienda revisar las recomendaciones del Manual de Vacunaciones e Inmunizaciones de Euskadi para más información sobre los grupos de riesgo.

(3) En la población adulta de 65 años o más:

Se sustituirá la vacuna antineumocócica VNP23 por la VCN20. La sustitución se realizará de forma progresiva y se **priorizará en aquellas personas con 75 años o más** que sólo presenten riesgo por edad. Se recomienda una vacunación oportunista.

Sustitución de la vacuna VNP23 por VNC20	
Vacunación antineumocócica previa	Recomendación de administración de VNC20
NO VACUNADO	1 dosis
Vacunado con VNP23	No requiere ninguna dosis adicional

2025ERAKO ALDAKETAK HAUREN TXERTAKETA-EGUTEGIAN

Haur txertaketa egutegian:

Errotabirusaren aurkako txertoa

Errotabirusaren aurkako txertoa sartuko da, hiru dosiko txertaketa-pauta, 2, 4 eta 6 hilabeterekin. Txerto berri hau 2025eko urtariletik aurrera jaiotako biztanleei emango zaie.

Pneumokokoaren aurkako txerto konjugatua, 15 balentea (VNC15)

VNC13aren ordeztu VNC15 jarriko da, 2, 4 eta 11 hilabetetan hemandako dosiekin.

VNC15 txerto berria 2025eko urtariletik aurrera emango da, bai 2025etik aurrera jaiotako biztanleei dagokienez, bai 2024an jaiotako biztanleei dagokienez, baldin eta VCN13 txertoarekin hasitako txertaketa-pauta osatu behar badute, taulan adierazten denaren arabera:

CAMBIOS EN EL CALENDARIO VACUNAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL PARA EL AÑO 2025

En el calendario vacunal infantil:

Vacuna contra el Rotavirus

Se incluirá la vacuna contra el rotavirus con una pauta vacunal de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses. Esta nueva vacuna se administrará a la población nacida a partir de enero del 2025.

Vacuna antineumocócica conjugada 15 valente (VNC15)

Se sustituirá la VNC13 por la VNC15, con dosis administradas a los 2, 4 y 11 meses de edad.

La nueva vacuna VNC15 se administrará a partir de enero del 2025, tanto en la población recién nacida a partir de 2025 como en población nacida en 2024 que requiera completar su pauta vacunal iniciada con VCN13 según se indica en la tabla:

		ADINA		
Aurretiko txertaketa antineumokozikoa	Dosi kop.	2 hilabete	4 hilabete	11 hilabete
Aurretiazko dosirik gabe	3	VNC 15	VNC 15	VNC 15
VNC 13 dosi 1	2		VNC 15	VNC 15
2 dosi VNC 13	1			VNC 15
3 dosi VNC 13	0	Ez du behar	Ez du behar	Ez du behar

Arrisku taldeetako haur txertaketa egutegian:

VNC20

VNC13 eta VNP23 jarraibide sekuentzialaren ordeztu, VNC20 jarriko da, administrazioen hasteko adinaren araberrako jarraibidearekin, taulan jasotzen den bezala:

Pneumokokoaren aurkakotxertaketa haurren arrisku-taldeetan				
Adina	Aurretikotxertaketa antineumokozikoa		VNC15	VNC20
< 2 urte	Txertatugabea	2-6 hilabete	3+1	Dosi 1 dosi 8 aste igaro ondoren
		7-11 hilabete	2+1	Dosi 1 dosi 8 aste igaro ondoren
		12-23 hilabete	2 dosi (8 asteko tarte gutxienez)	Dosi 1 dosi 8 aste igaro ondoren
	Bete gabeko jarraibidea		Jarraibidea bete adinaren arabera	Dosi 1 dosi 8 aste igaro ondoren
2-5 urte	Txertatugabea		2 dosi (8 asteko tarte gutxienez)	Dosi 1 dosi 8 aste igaro ondoren
	Bete gabeko jarraibidea 2+1 VNC13 edo VNC15ekin betetako jarraibidea		Dosi 1 (8 asteko tarte gutxienez)	Dosi 1 dosi 8 aste igaro ondoren
≥ 6 urte	Txertatugabea		Dosi 1	Dosi 1 dosi 8 aste igaro ondoren
	VNC13 txertatuta		Dosi 1 (8 asteko tarte gutxienez)	Dosi 1 dosi 8 aste igaro ondoren
	VNP23 txertatuta		Dosi 1 (12 hilabeteko tarte)	Dosi 1 dosi 1 urte igaro ondoren
	VNC13+VNP23 txertatuta		Dosi 1 (12 hilabeteko edo 5 urteko tarte)	Dosi 1 dosi 5 urte igaro ondoren

		EDAD		
Vacunación antineumocócica previa	N. dosis	2 meses	4 meses	11 meses
Sin dosis previas	3	VNC 15	VNC 15	VNC 15
1 dosis VNC 13	2		VNC 15	VNC 15
2 dosis VNC 13	1			VNC 15
3 dosis VNC 13	0	No requiere	No requiere	No requiere

En el calendario vacunal infantil de grupos de riesgo:

VNC20

Se sustituirá la pauta secuencial de VNC13 y VNP23 por la VNC20 con una pauta según la edad de inicio de administración como se recoge en la tabla:

Vacunación antineumocócica en grupos de riesgo infantil				
Edad	Vacunación antineumocócica previa		VNC15	VNC20
< 2 años	No vacunado	2-6 meses	3+1	1 dosis a las 8 semanas
		7-11 meses	2+1	1 dosis a las 8 semanas
		12-23 meses	2 dosis (intervalo mínimo 8 semanas)	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunación incompleta		Completar la pauta según edad	1 dosis a las 8 semanas
2-5 años	No vacunado		2 dosis (intervalo mínimo 8 semanas)	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunación incompleta Vacunación completa 2+1 con VNC13 o VNC15		1 dosis (intervalo mínimo 8 semanas)	1 dosis a las 8 semanas
≥ 6 años	No vacunado		1 dosis	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunado con VNC13		1 dosis (intervalo mínimo de 8 semanas)	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunado con VNP23		1 dosis (intervalo de 12 meses)	1 dosis transcurrido un año
	Vacunado con VNC13+VNP23		1 dosis (intervalo de 12 meses ó 5 años)	1 dosis transcurridos 5 años

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma.

Guillermo Guerrero Aldaña
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila
Director de Salud Pública y Adicciones/ Departamento de Salud