

ENCUESTA DE HÁBITOS SEXUALES DE PERSONAS QUE SE REALIZAN LA PRUEBA DEL VIH POR HABER MANTENIDO PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO.

Durante el periodo comprendido entre abril del año 2000 y abril del año 2001 se han realizado en el servicio de E.T.S. de Bilbao y en las consultas de VIH de San Sebastián y Vitoria 725 encuestas a personas que acuden para realizarse el test del VIH de forma voluntaria: 450 en Bilbao (62%), 139 en S.Sebastián (19,2%) y 136 en Vitoria (18,8%). El 46,8% (339) son hombres y el 53,2% (386) mujeres. La edad media de los hombres es de 32,5 años y la edad media de las mujeres de 30,4 años. El 51,5% (374) refiere haber tenido prácticas heterosexuales, el 7,2% (52) prácticas heterosexuales con una persona VIH+ y el 15,6% (113) prácticas homosexuales. El 25,7% (186) dice ejercer la prostitución.



Debido a que las mujeres que ejercen la prostitución se realizan el test de forma periódica, hemos dividido el estudio en dos partes:

- 1- Personas con prácticas heterosexuales, prácticas heterosexuales con personas VIH+ y prácticas homosexuales.
- 2- Personas que ejercen la prostitución.

1- ENCUESTA DE HÁBITOS SEXUALES DE PERSONAS QUE SE REALIZAN LA PRUEBA DEL VIH POR HABER MANTENIDO PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO


1-1 Datos generales:

Entre abril del 2000 y abril del 2001 se han realizado 539 encuestas a personas que han tenido una práctica de riesgo heterosexual u homosexual y que acuden a realizarse el test del VIH de forma voluntaria (no se incluyen las personas que ejercen la prostitución).

El 57,3% (309) de las encuestas se ha realizado en el servicio de E.T.S. de Bilbao, el 22,6% (122) en la consulta de VIH de Vitoria y el 20% (108) en la consulta de VIH de San Sebastián.

El 62,9% (339) son hombres con una edad media de 32,5 años y el 37,1% (200) son mujeres con una edad media de 29,6 años.

El 69,4% (374) refiere haber tenido prácticas heterosexuales. El 9,6% (52) dice haber tenido prácticas heterosexuales con una persona VIH+ y el 21% (113) refiere haber tenido prácticas homosexuales.



1-2 Relación sexual que ha motivado la consulta:

Al preguntar por la práctica sexual que ha motivado la consulta, el 69,1% (372) de los encuestados señala haber mantenido una relación sexual de penetración vaginal, el 24,2% (131) refiere penetración anal y el 6,7% (36) sexo oral.



Preguntados por el uso del preservativo en la práctica sexual que ha motivado la realización del test, el 72,9% (393) no lo ha utilizado, el 14,7% (79) lo ha utilizado pero “se le ha roto” y el 12,4% (67) dice haber usado preservativo.


Como motivos mas citados para no usar preservativo, el 26,6% dice que “se fía de su pareja”, el 15,5% que “no disponía de preservativo”, el 14,7% que “su pareja es conocida”, el 10,4% “no se ha planteado usarlo”, el 9,7% “por intoxicación etílica o consumo de otras drogas “ el 7,9% “no me gusta el preservativo” el 4,8% “por oposición de la pareja” el 12,2% por otras causas no especificadas y el 12,7% no contesta.

El 75,1% (405) ha tenido la relación con pareja esporádica, mientras que el 24,9% (134) la ha tenido con su pareja habitual (pareja habitual con riesgo conocido o sospechado).

1-3Hábitos sexuales con pareja/s esporádica/s en los 6 últimos meses:

El 61,2% (328) de los encuestados refiere haber tenido una o más parejas esporádicas en los 6 últimos meses, siendo la media de 3,9 parejas en los hombres y de 2 parejas en las mujeres.

En las relaciones de penetración anal o vaginal con parejas esporádicas en los 6 últimos meses, el 43,1% de los encuestados ha utilizado *siempre* preservativo, el 35% lo ha utilizado *a veces*, el 16,1% no lo ha utilizado *nunca* y el 5,8% *no contesta*.



En las relaciones de sexo oral, el 4,9% ha utilizado *siempre* preservativo, el 10,2% lo ha utilizado *a veces*, el 64,1% no lo ha utilizado *nunca* y el 20,8% *no sabe o no contesta*.

Los motivos referidos para no usar *siempre* preservativo en las prácticas sexuales con pareja esporádica en los 6 últimos meses son principalmente: “me fío de mi pareja” (22,4%), “no disponía de preservativo” (15,8%), “practico sexo oral sin eyaculación” (19,0%), “mi pareja es conocida” (11,8%), “no me he planteado usarlo” (11%), “intoxicación etílica o consumo de otras drogas” (7,7%), “no me gusta el preservativo” (9,2%), “por oposición de mi pareja” (5,5%)

1-4-Análisis de colectivos específicos

a) Heterosexuales.

Relación que ha motivado la consulta:

El 69,4% (374) de los encuestados acude a la consulta por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo.


El 74,6% (279) de los encuestados no ha utilizado preservativo en la relación que ha motivado la consulta, el 15% (56) lo ha usado pero se le ha roto, el 8,8% (33) lo ha utilizado y el 1,6% (6) no contesta.

Los motivos expresados para no utilizar preservativo en sus relaciones de penetración son: “me fío de mi pareja” (27,3%), “no disponía de preservativo” (18,9%), “mi pareja es conocida” (14,7%), “no me he planteado usarlo” (11,9%), “intoxicación etílica” (11,5%), “el preservativo no me gusta” (8%), “oposición de mi pareja” (5,6%), otras causas (6,3%) y no contesta (11,9%).

Relaciones con pareja esporádica en los 6 últimos meses:

El 61,5% de los encuestados refiere haber mantenido una relación sexual con pareja esporádica en los 6 últimos meses.

En las relaciones de penetración, el 37,3% ha utilizado *siempre* preservativo, el 22,2% lo ha utilizado *generalmente*, el 18,7% no ha utilizado *nunca* preservativo, el 8,9% dice que lo ha utilizado *la mitad de las veces*, el 7,1% lo ha usado *ocasionalmente*, y el 5,8% *no contesta*.



En relaciones de sexo oral, el 61,5% dice que no ha utilizado *nunca* preservativo, el 3,8% *generalmente*, el 3,1% *la mitad de las veces*, el 3,1% ha utilizado *siempre* preservativo, el 2,3% *ocasionalmente*, y el 26,2% *no contesta*.

Las razones referidas para no usar preservativo son:, “me fío de mi pareja” (24,6%), “no disponía de preservativo” (19,4%), “mi pareja es conocida” (13,1%), “no me he planteado usarlo” (11,5%) “el preservativo no me gusta” (10,5%), “intoxicación etílica o consumo de drogas” (10%), “practico sexo oral sin eyaculación” (8,4%), “oposición de la pareja” (6,8%), “otras causas” (4,7%) y no contesta (16,2%).

b) Homosexuales.

Relación que ha motivado la consulta:

El 21% (113) de los encuestados acude a la consulta por haber mantenido una relación homosexual de riesgo.

El 83,2% (94) refiere penetración anal como práctica de riesgo y el 16,8% (19) felación.

El 62,8% (59) de los encuestados no ha utilizado preservativo en penetración anal, el 13,8% (13) lo ha usado pero se le ha roto, el 22,3% (21) lo ha utilizado y el 1,1% (1) no contesta.

Los motivos expresados para no utilizar preservativo en sus relaciones de penetración son: “me fío de mi pareja” (33,9%), “mi pareja es conocida” (15,3%), “el preservativo no me gusta” (10,2%), “no me he planteado usarlo” (10,2%), “intoxicación etílica” (6,8%), “oposición de mi pareja” (3,4%), “no disponía de preservativo” (1,7%), otras causas (11,9%) y no contesta (18,6%).

El 100% (19) no ha usado preservativo en relaciones de sexo oral.


Los motivos para no usar preservativo son: “me fío de mi pareja” (10,5%), “mi pareja es conocida” (5,3%), “el preservativo no me gusta” (5,3%), “no me he planteado usarlo” (5,3%) y otras causas (78,9%).

El 71,7% (81) ha tenido la relación sexual con una pareja esporádica y el 28,3% (32) con una pareja habitual.

Relaciones con pareja esporádica en los 6 últimos meses:

El 74,3% (84) de los encuestados refiere haber mantenido una relación sexual con pareja esporádica en los 6 últimos meses, resultando una media de 4,9 parejas por encuestado.

En las relaciones de penetración, el 61,1% ha utilizado *siempre* preservativo, el 13,9% lo ha utilizado *generalmente*, el 11,1% lo ha usado *ocasionalmente*, el 6,9% no ha utilizado *nunca* preservativo, el 2,8% dice que lo ha utilizado *la mitad de las veces* y el 4,2% *no contesta*.



En relaciones de sexo oral, el 69,1% dice que no ha utilizado *nunca* preservativo, el 7,4% ha utilizado *siempre* preservativo, el 5,9% *ocasionalmente*, el 4,4% *generalmente*, el 2,9% *la mitad de las veces* y el 10,3% *no contesta*.

Las razones referidas para no usar preservativo son: “práctico sexo oral sin eyaculación” (50%), “me fío de mi pareja” (15,7%), “no me he planteado usarlo” (10%), “mi pareja es conocida” (7,1%), “el preservativo no me gusta” (7,1%), “no disponía de preservativo” (5,7%), “intoxicación etílica” (2,9%), “oposición de mi pareja” (2,9%), “otras causas” (5,6%) y no contesta (9,9%).

c) Relación heterosexual con una persona VIH+.

Relación que ha motivado la consulta:

El 9,6% (52) de los encuestados refiere como práctica sexual de riesgo, una relación heterosexual con una persona VIH+. El 65,4% (34) son mujeres y el 34,6% (18) hombres. Las mujeres tienen una media de edad de 31,4 años y los hombres una media de 33,3 años.

De los hombres que refieren esta práctica sexual de riesgo, el 66,7% (12) no ha utilizado preservativo en la relación sexual motivo de consulta. De las mujeres que refieren la misma práctica, el 50% (17) no ha utilizado preservativo.

Las razones más referidas por los hombres para no usar preservativo son: “no disponía de preservativo” (25%), “me fío de mi pareja” (25%), otras causas (25%) y no contesta (25%).

En el caso de las mujeres, las razones apuntadas para no usar preservativo son: “mi pareja es conocida” (35,3%), “no disponía de preservativo” (17,6%) y “me fío de mi pareja” (11,8%), “intoxicación etílica” (5,9%), “oposición de la pareja” (5,9%) y otras causas (41%).

La relación que ha motivado la consulta la ha tenido el 50% (9) de los hombres con su pareja habitual. En el caso de las mujeres, este porcentaje llega al 70,6% (24).

Relación sexual con pareja esporádica en los 6 últimos meses:

El 50% (9) de los hombres ha tenido pareja esporádica en los 6 últimos meses con una media de 1,2 parejas. En el caso de las mujeres, el 14,7% (5) ha tenido pareja esporádica con una media de 1,4 parejas.

En relaciones de penetración con parejas esporádicas, el 42,9% ha utilizado *siempre* preservativo y el 21,4% no lo ha utilizado *nunca*.

En relaciones de sexo oral con parejas esporádicas, el 66,7% no ha utilizado *nunca* preservativo y el 11,1% dice que lo ha utilizado *siempre*.


Relación sexual con pareja habitual:

El 72,2% (13) de los hombres tiene pareja habitual con una media de

2,5 años de antigüedad. El 79,4% (27) de las mujeres tiene pareja habitual con una media de 5,4 años de antigüedad.


El 69,2% de los hombres utiliza preservativo *siempre o casi siempre* en sus relaciones de penetración con su pareja habitual, el 7,7% no lo utiliza *nunca* y el 23,1% *no sabe o no contesta*.

El 84,6% de las mujeres utiliza preservativo *siempre o casi siempre* en sus relaciones de penetración con su pareja habitual, el 7,7% no lo utiliza *nunca* y el 7,7% *no sabe o no contesta*.



El 37,5% de los hombres utiliza *siempre o casi siempre* preservativo en sus relaciones de sexo oral con su pareja habitual, el 25% no lo utiliza *nunca* y el 37,5% *no sabe o no contesta*.

El 27,8% de las mujeres utiliza *siempre o casi siempre* preservativo en sus relaciones de sexo oral con su pareja habitual, el 55,5% no lo utiliza *nunca* y el 16,7% *no sabe o no contesta*.




2- ENCUESTA DE HÁBITOS SEXUALES DE PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN.

2-1 Datos generales:

Entre abril del año 2000 y abril del año 2001, se han realizado en el servicio de E.T.S. de Bilbao y en las consultas de VIH de San Sebastián y de Vitoria 186 encuestas a personas que ejercen la prostitución: 141 en Bilbao (75,8%), 31 en San Sebastián (16,7%) y 14 en Vitoria(7,5%).

Todas eran mujeres con una edad media de 31,3 años. El 53,2% (99) de las encuestadas refería rotura del preservativo una o más veces en los 6 últimos meses y el 55,4% (102) decía tener pareja habitual.



2-2 Hábitos con clientes:


El 97,8% (182) refiere tener relaciones de penetración vaginal con sus clientes. El 89% (162) ha utilizado *siempre* el preservativo y el 11% (20) lo ha utilizado *a veces*. El 23,7% (44) refiere tener relaciones de penetración anal con sus clientes. El 84,1% (37) ha utilizado *siempre* preservativo y el 15,9% (7) dice que lo ha utilizado *a veces*.

El 96,2% (179) refiere tener relaciones de sexo oral con sus clientes. El 64,2% (115) ha utilizado *siempre* preservativo, el 32,4% (58) lo ha utilizado *a veces* y el 3,4% (6) no lo ha utilizado *nunca*.

20 encuestadas refieren no utilizar *siempre* el preservativo en sus relaciones de penetración vaginal citando como motivos: “clientes de confianza” (55%), “mis clientes no quieren” (20%) y “me pagan más” (20%).

7 encuestadas refieren no utilizar *siempre* preservativo en sus relaciones de penetración anal citando como motivos: “clientes de confianza” (42,9%), “mis clientes no quieren” (14,3%) y “me pagan más” (14,3%).

En las relaciones de sexo oral, 63 encuestadas dicen que no utilizan *siempre* el preservativo y refieren como motivos: “clientes de confianza” (34,9%), “no quieren mis clientes” (31,7%), “sexo oral sin eyaculación” (20,6%) y “me pagan más” (6,3%).



2-3 Hábitos con pareja habitual:

El 55,4% (102) de las encuestadas refiere tener pareja habitual. Al preguntar por la utilización del preservativo con su pareja habitual en relaciones de penetración vaginal, el 67,3% (68) de las encuestadas que realiza esa práctica (101) dice que no lo ha utilizado nunca. En penetración anal, de 26 encuestadas que refieren esa práctica, el 84,6% (22) dice que no lo ha utilizado nunca. En relaciones de sexo oral, de 100

encuestadas que realizan esa práctica, el 68% (68) dice que no lo ha utilizado nunca.

3- CONCLUSIONES:

- **El motivo principal por el que se acude a realizar del test del VIH es haber tenido una relación heterosexual sin protección con una pareja esporádica.**
- **La utilización del preservativo en el colectivo homosexual, tanto en penetración como en sexo oral, es similar al colectivo heterosexual.**
- **En parejas serodiscordantes, la utilización del preservativo es alta en relaciones de penetración pero baja en sexo oral mostrando así, en esta práctica, una percepción inadecuada del riesgo de infección por VIH.**
- **El colectivo que ejerce la prostitución está muy concienciado del riesgo de infección por VIH, utilizando el preservativo en elevados porcentajes tanto en relaciones de penetración como de sexo oral.**